

Kartierungsbogen			
Gemeinde: Rohlstorf	Kartierer: Gemperlein	Nr.: 40	Dat: 28.06.85
Biotoptyp:	Wald	Code:	WM, GF, VR
Kurzbeschreibung:	Kleiner, relativ trockener, von Schwarz-Erlen dominierter Laubmischwald inmitten einer großen Ackerfläche. Westlich vorgelagert hat sich in einer nassen Senke als Rest eines Feuchtgrünlandes eine Flatterbinsen-Flur entwickelt, die mit mehreren kleinen Schilf- und Rohrkolbenbeständen durchsetzt ist.		
Botanischer Name	Deutscher Name	Gefährdung	Bemerkung
<i>Agropyron repens</i>	Gewöhnliche Quecke		
<i>Agrostis stolonifera</i>	Weißes Straußgras		
<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle		dominant
<i>Alnus incana</i>	Grau-Erle		
<i>Carex rostrata</i>	Schnabel-Segge		
<i>Dactylis glomerata</i>	Wiesen-Knäuelgras		
<i>Fagus sylvatica</i>	Rotbuche		
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewöhnliche Esche		
<i>Galium palustre</i>	Sumpf-Labkraut		
<i>Glyceria fluitans</i>	Flutender Schwaden		
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Binse		dominant
<i>Milium effusum</i>	Flattergras		
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohrglanzgras		
<i>Phragmites australis</i>	Schilf		
<i>Prunus avium</i>	Vogel-Kirsche		
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche		
<i>Rubus idaeus</i>	Himbeere		
<i>Salix cinerea</i>	Grau-Weide		
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder		
<i>Silene dioica</i>	Tag-Lichtnelke		dominant
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüßer Nachtschatten		

Kartierungsbogen

Gemeinde: Rohlstorf	Kartierer: Gemperlein	Nr.: 41	Dat: 28.06.85
Biotoptyp:	Gebüsch	Code:	WH, GH
Kurzbeschreibung:	Kahlschlagfläche, die heute von einem dichten Holunder- und Brombeergebüsch bewachsen ist. Randlich - vor allem am Ostrand - stehen mehrere alte Eichen und einige Eschen. Der Südteil wird von einer ca. 7 m tiefen Senken mit steilen Böschungen gebildet (Toteisloch?), die zur Zeit von einer dichten Brennesselflur eingenommen wird. Die im Biotop häufigen Schwarz- (und Grau-) Erlen sind offensichtlich gepflanzt worden.		

Botanischer Name	Deutscher Name	Gefährdung	Bemerkung
<i>Aegopodium podagraria</i>	Giersch		
<i>Agropyron repens</i>	Gewöhnliche Quecke		
<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle		
<i>Alnus incana</i>	Grau-Erle		
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wilder Kerbel		
<i>Arctium lappa</i>	Große Klette		
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Glatthafer		
<i>Dactylis glomerata</i>	Wiesen-Knäuelgras		
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Rasen-Schmiele		
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewöhnliche Esche		
<i>Galium aparine</i>	Kletten-Labkraut		
<i>Holcus mollis</i>	Weiches Honiggras		
<i>Milium effusum</i>	Flattergras		
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche		
<i>Rubus fruticosus</i>	Brombeere		
<i>Rubus idaeus</i>	Himbeere		
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder		
<i>Silene alba</i>	Weißer Lichtnelke		
<i>Silene dioica</i>	Tag-Lichtnelke		
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn		
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennessel		

Kartierungsbogen			
Gemeinde: Rohlstorf	Kartierer: Gemperlein	Nr.: 42	Dat: 28.06.85
Biotoptyp:	Bruchwald	Code:	WB, WM, WH
Kurzbeschreibung:	Langes, schmal gestrecktes Waldgebiet inmitten landwirtschaftlich intensiv genutzter Fläche. Der relativ trocken gelegene Wetteil wird von einem Eichenwald eingenommen. Der Großteil der Fläche wird von einem nassen Erlenbruch bestanden. Im Mittelteil sind Berg-Ahorn und Lärchen beigemischt. Der hier verlaufende Graben liegt ca. 1,5 m unter Flur und hat zu einer relativen Trockenlegung dieses Abschnittes geführt. Zum Nordrand hin ist die Krautschicht besser ausgebildet; der Totholzanteil nimmt zu. Der Nordrand selbst wird von einem vor allem aus Hasel bestehendem Gebüsch gebildet.		
Botanischer Name	Deutscher Name	Gefährdung	Bemerkung
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn		
<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle		dominant
<i>Alnus incana</i>	Grau-Erle		
<i>Angelica sylvestris</i>	Wilde Engelwurz		
<i>Caltha palustris</i>	Sumpfdotterblume		
<i>Carex acutiformis</i>	Sumpf-Segge		
<i>Carex elongata</i>	Verlängerte Segge		
<i>Cirsium oleraceum</i>	Kohldistel		
<i>Corylus avellana</i>	Haselnuß		
<i>Crataegus laevigata</i>	Zweiggriffeliger Weißdorn		
<i>Crepis paludosa</i>	Sumpf-Pippau		
<i>Dactylis glomerata</i>	Wiesen-Knäuelgras		
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost		
<i>Filipendula ulmaria</i>	Großes Mädesüß		
<i>Iris pseudacorus</i>	Sumpf-Schwertlilie	BArtSchV	
<i>Larix decidua</i>	Europäische Lärche		
<i>Lycopus europaeus</i>	Ufer-Wolfstrapp		
<i>Milium effusum</i>	Flattergras		
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohrglanzgras		
<i>Populus</i>	Pappel		
<i>Primula elatior</i>	Große Schlüsselblume		
<i>Prunus avium</i>	Vogel-Kirsche		
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche		dominant
<i>Salix alba</i>	Silber-Weide		
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder		
<i>Silene dioica</i>	Tag-Lichtnelke		
<i>Stachys sylvatica</i>	Wald-Ziest		
<i>Stellaria nemorum</i>	Wald-Sternmiere		
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennnessel		
<i>Valeriana officinalis</i>	Echter Arznei-Baldrian		

Kartierungsbogen			
Gemeinde: Rohlstorf	Kartierer: Gemperlein	Nr.: 43	Dat: 28.06.85
Biotoptyp:	Wald	Code:	WM
Kurzbeschreibung:	Jüngerer Eichenbestand, der aus einem ehemaligen Eichen-Buchen-Bestand mit relativ hohem Fichtenanteil (einige alte Fichten stehen heute noch am Rand) hervorgegangen ist. Am Südrand steht heute noch eine Reihe alter Eichen, im Bestand eine einzige Alteiche. Die Ostseite wird von einem auf einem Wall stockenden Hasel- und Holundergebüsch gebildet. Randlich treten auch noch vereinzelt alte Eschen auf. Im Nordteil ist die Strauchschicht schon gut ausgebildet. Die Krautschicht ist im gesamten Bereich gut ausgebildet.		
Botanischer Name	Deutscher Name	Gefährdung	Bemerkung
<i>Anemone nemorosa</i>	Busch-Windröschen		
<i>Arum maculatum</i>	Geflecker Aronstab		
<i>Betula pubescens</i>	Moor-Birke		
<i>Carpinus betulus</i>	Hainbuche		
<i>Corylus avellana</i>	Haselnuß		
<i>Crataegus monogyna</i> agg.	Eingriffeliger Weißdorn		
<i>Dactylis glomerata</i>	Wiesen-Knäuelgras		
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewöhnliche Esche		
<i>Galium album</i>			
<i>Geum urbanum</i>	Echte Nelkenwurz		
<i>Lamium galeobdolon</i>	Goldnessel		
<i>Lonicera xylosteum</i>	Rote Heckenkirsche		
<i>Melica uniflora</i>	Einblütiges Perlgras		
<i>Milium effusum</i>	Flattergras		
<i>Picea abies</i>	Fichte		
<i>Prunus spinosa</i>	Schwarzdorn		
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche		dominant
<i>Rubus idaeus</i>	Himbeere		
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder		
<i>Stellaria holostea</i>	Große Sternmiere		

Kartierungsbogen

Gemeinde: Rohlstorf	Kartierer: Gemperlein	Nr.: 44	Dat: 28.06.85
Biotoptyp:	Kleingewässer	Code:	SL, WG, VR
Kurzbeschreibung:	Zwei Tümpel inmitten großer Ackerfläche. Einer wird von einem dichten Weidengebüsch umstanden. Beide werden von einem Rohrkolben- und Glanzgras-Röhricht eingenommen. Die ehemals größere Senke ist zentral mit Boden aufgefüllt worden. Hier hat sich ein der Fuchsschwanzwiese nahestehender Bestand entwickelt. Struktureicher Kleingewässer-Biotop.		

Botanischer Name	Deutscher Name	Gefährdung	Bemerkung
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Gewöhnlicher Froschlöffel		
<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanzgras		dominant
<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesen-Schaumkraut		
<i>Carex echinata</i>	Igel-Segge	3	
<i>Carex hirta</i>	Behaarte Segge		
<i>Carex vulpina</i>	Fuchs-Segge	3	
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel		
<i>Crataegus laevigata</i>	Zweiggriffeliger Weißdorn		
<i>Dactylis glomerata</i>	Wiesen-Knäuelgras		
<i>Equisetum arvense</i>	Acker-Schachtelhalm		
<i>Festuca pratensis</i>	Wiesen-Schwingel		
<i>Iris pseudacorus</i>	Sumpf-Schwertlilie	BArtSchV	
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Binse		
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse		
<i>Lycopus europaeus</i>	Ufer-Wolfstrapp		
<i>Myosotis scorpioides</i>			
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohrglanzgras		
<i>Salix caprea</i>	Sal-Weide		dominant
<i>Salix cinerea</i>	Grau-Weide		dominant
<i>Salix spec.</i>	Weide		
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder		
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Gewöhnliche Teichsimse		
<i>Sium latifolium</i>	Großer Merk		
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüßer Nachtschatten		
<i>Sparganium erectum</i>	Aufrechter Igelkolben		
<i>Typha latifolia</i>	Breitblättriger Rohrkolben		
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennnessel		

Kartierungsbogen			
Gemeinde: Rohlstorf	Kartierer: Gemperlein	Nr.: 68	Dat: 09.0785
Biotoptyp:	Erlenbruch	Code:	WB, WG, VR, WM
Kurzbeschreibung:	An steilen Abschnitten des Klüth-Sees gelegenes artenreiches Gebüsch und Erlen-Wld. dem am Ufer ein mehr oder weniger schmaler Schilfgürtel vorgelagert ist. In Teilbereichen dominiert die Esche und der Berg-Ahorn tritt auf. Der Schilfgürtel läuft zum Teil aus. An solchen Stellen reicht das Gebüsch dann bis ans Ufer. Auf kleinen Uferabschnitten sind fragmentarisch Flutrasen ausgebildet.		
Botanischer Name	Deutscher Name	Gefährdung	Bemerkung
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn		
<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle		dominant
<i>Berula erectum</i>	Aufrechter Merk		
<i>Caltha palustris</i>	Sumpfdotterblume		
<i>Carex elongata</i>	Verlängerte Segge		
<i>Carex pallescens</i>	Bleiche Segge		
<i>Cirsium oleraceum</i>	Kohldistel		
<i>Cirsium palustre</i>	Sumpf-Kratzdistel		
<i>Corylus avellana</i>	Haselnuß		
<i>Crataegus monogyna</i> agg.	Eingriffeliger Weißdorn		
<i>Crepis paludosa</i>	Sumpf-Pippau		
<i>Eleocharis palustris</i>	Gewöhnliche Sumpfbinsse		
<i>Epilobium hirsutum</i>	Zottiges Weidenröschen		
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost		
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewöhnliche Esche		dominant
<i>Geum urbanum</i>	Echte Nelkenwurz		
<i>Glyceria maxima</i>	Wasser-Schwaden		
<i>Humulus lupulus</i>	Hopfen		
<i>Juncus articulatus</i>	Glieder-Binsse		
<i>Juncus compressus</i>	Zusammengedrückte Binsse		
<i>Juncus inflexus</i>	Blaugrüne Binsse		
<i>Lycopus europaeus</i>	Ufer-Wolfstrapp		
<i>Mentha aquatica</i>	Wasser-Minze		
<i>Myosotis scorpioides</i>			
<i>Phragmites australis</i>	Schilf		dominant
<i>Primula elatior</i>	Große Schlüsselblume		
<i>Prunus avium</i>	Vogel-Kirsche		
<i>Prunus padus</i>	Echte Traubenkirsche		
<i>Prunus spinosa</i>	Schwarzdorn		
<i>Ranunculus flammula</i>	Brennender Hahnenfuß		
<i>Rubus idaeus</i>	Himbeere		
<i>Salix alba</i>	Silber-Weide		dominant
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder		
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Gewöhnliche Teichsimse		
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüßer Nachtschatten		
<i>Veronica beccabunga</i>	Bachbunge		

Kartierungsbogen			
Gemeinde: Rohlstorf	Kartierer: Gemperlein	Nr.: 69	Dat: 09.07.85
Biotoptyp:	Eichen-Hainbuchen-Wald	Code:	WM
Kurzbeschreibung:	Eichen-Hainbuchen-Wald auf unterschiedlich feuchten Standorten. In den relativ feuchtesten Bereichen tritt die Esche stark hinzu. Die Strauchschicht ist nur fragmentarisch ausgebildet. Die Krautschicht ist nicht sehr üppig und relativ artenarm. Der Wald ist randlich von einem dicht bewachsenem Wall umgeben, wodurch das lichte Waldinnere mehr oder weniger gut abgeschirmt wird.		
Botanischer Name	Deutscher Name	Gefährdung	Bemerkung
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn		
<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle		
<i>Anemone nemorosa</i>	Busch-Windröschen		
<i>Betula pendula</i>	Hänge-Birke		
<i>Carpinus betulus</i>	Hainbuche		
<i>Corylus avellana</i>	Haselnuß		
<i>Crataegus monogyna</i> agg.	Eingriffeliger Weißdorn		
<i>Fagus sylvatica</i>	Rotbuche		
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewöhnliche Esche		
<i>Lonicera xylosteum</i>	Rote Heckenkirsche		
<i>Maianthemum bifolium</i>	Schattenblümchen		
<i>Melica uniflora</i>	Einblütiges Perlgras		
<i>Milium effusum</i>	Flattergras		
<i>Oxalis acetosella</i>	Wald-Sauerklee		
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Vielblütige Weißwurz		
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche		dominant
<i>Rubus idaeus</i>	Himbeere		
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder		
<i>Silene dioica</i>	Tag-Lichtnelke		
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche		
<i>Stellaria nemorum</i>	Wald-Sternmiere		

Kartierungsbogen			
Gemeinde: Rohlstorf	Kartierer: Gemperlein	Nr.: 76	Dat: 10.07.85
Biotoptyp:	Fluß	Code:	FF, VS, VR, ZI
Kurzbeschreibung:	Inmitten meist intensiv als (Weide-) Grünland genutzter Talniederung fließende Trave. Das Flußbett ist mit steilen Böschungen unterschiedlich stark eingeschnitten (min 2 m). Die Ufer sind vor längerer Zeit in Teilbereichen befestigt worden; diese Ufersicherungen werden aber offensichtlich nicht mehr erneuert. Im gesamten Westteil dominieren große Teichrosenfelder; Zum Teil sind Pfeilkraut-Röhrichte ausgebildet. Unterwasser-Laichkraut- und Igelkolben-Bestände sind reichlich ausgebildet. In dieser Zusammensetzung und Größe sind all diese Bestände nur noch an wenigen Stellen in Schleswig-Holstein ausgebildet. Im Bereich der Teichrosenfelder kommt die Gebänderte Prachtilibelle (Calopteryx splendens, RLS-H) und der Große Blaupfeil (Orethrum cancellatum, RLS-H) aber auch andere z.T. seltene Libellenarten, in selten hoher Abundanz vor.		
Botanischer Name	Deutscher Name	Gefährdung	Bemerkung
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wilder Kerbel		
<i>Butomus umbellatus</i>	Schwabenblume		
<i>Epilobium hirsutum</i>	Zottiges Weidenröschen		
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost		
<i>Filipendula ulmaria</i>	Großes Mädesüß		
<i>Glyceria maxima</i>	Wasser-Schwaden		
<i>Iris pseudacorus</i>	Sumpf-Schwertlilie	BArtSchV	
<i>Lythrum salicaria</i>	Blut-Weiderich		
<i>Nuphar lutea</i>	Gelbe Teichrose	BArtSchV	
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohrglanzgras		
<i>Phragmites australis</i>	Schilf		
<i>Potamogeton crispus</i>	Krauses Laichkraut		
<i>Potamogeton perfoliatus</i>	Durchwachsenes Laichkraut		
<i>Rorippa amphibia</i>	Wasser-Sumpfkresse		
<i>Rumex hydrolapathum</i>	Fluß-Ampfer		
<i>Sagittaria sagittifolia</i>	Gewöhnliches Pfeilkraut		
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Gewöhnliche Teichsimse		
<i>Sparganium emersum</i>	Einfacher Igelkolben		
<i>Sparganium erectum</i>	Aufrechter Igelkolben		
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn		
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennessel		

Kartierungsbogen			
Gemeinde: Rohlstorf	Kartierer: Gemperlein	Nr.: 77	Dat: 13.11.85
Biotoptyp:	Wald	Code:	WM
Kurzbeschreibung:	Kleiner, auf einer aus dem umliegenden Grünland herausragenden Kuppe gelegener Laubholzmischwald. Die Strauchschicht ist nur schwach ausgebildet und besteht ausschließlich aus jungen Holunderpflanzen.		
Botanischer Name	Deutscher Name	Gefährdung	Bemerkung
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn		dominant
<i>Aegopodium podagraria</i>	Giersch		
<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle		
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wilder Kerbel		
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Waldzwenke		
<i>Carpinus betulus</i>	Hainbuche		
<i>Crataegus monogyna</i> agg.	Eingriffeliger Weißdorn		
<i>Dactylis glomerata</i>	Wiesen-Knäuelgras		
<i>Fagus sylvatica</i>	Rotbuche		dominant
<i>Glechoma hederacea</i>	Gundelrebe		
<i>Milium effusum</i>	Flattergras		dominant
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche		dominant
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder		
<i>Silene dioica</i>	Tag-Lichtnelke		
<i>Stellaria holostea</i>	Große Sternmiere		
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennessel		

Kartierungsbogen			
Gemeinde: Rohlstorf	Kartierer: Gemperlein	Nr.: 80	Dat: 01.10.85
Biotoptyp:	Röhricht, Wald	Code:	SM, WM, WB, VR
Kurzbeschreibung:	Südlicher Teil des Wardersees mit am Südufer durchgehendem, am Nordufer unterbrochenem, unterschiedlich breitem Röhrichtgürtel. Während am Nordufer zum angrenzenden Acker oder Grünland nur kleine Weidengebüsche oder vereinzelt Erlen wachsen, schließt sich am Südufer zum größten Teil ein Erlenbruchsaum an. Diesem folgt je nach Geländeneigung ein unterschiedlich breiter Erlen-Eschen-Wald, dem sich am Hochufer ein Buchenhochwald anschließt. Der Übergang zum „Rohlstorfer Wald“ ist mehr oder weniger fließend; eine klare Grenzziehung ist daher nicht möglich. Zusammen mit dem großen Schilfröhricht am Südufer des Sees und dem angrenzenden Grünland ist der Wardersee ornithologisch von überregionaler Bedeutung.		
Botanischer Name	Deutscher Name	Gefährdung	Bemerkung
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn		
<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle		dominant
<i>Alnus incana</i>	Grau-Erle		
<i>Betula pubescens</i>	Moor-Birke		
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Waldzwenke		
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Wechselblättriges Milzkraut		
<i>Cicuta virosa</i>	Wasserschierling		
<i>Cirsium oleraceum</i>	Kohldistel		
<i>Crataegus monogyna</i> agg.	Eingriffeliger Weißdorn		
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Rasen-Schmiele		
<i>Epilobium hirsutum</i>	Zottiges Weidenröschen		
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost		
<i>Fagus sylvatica</i>	Rotbuche		dominant
<i>Filipendula ulmaria</i>	Großes Mädesüß		
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewöhnliche Esche		dominant
<i>Glyceria maxima</i>	Wasser-Schwaden		dominant
<i>Humulus lupulus</i>	Hopfen		
<i>Iris pseudacorus</i>	Sumpf-Schwertlilie	BArtSchV	
<i>Lythrum salicaria</i>	Blut-Weiderich		
<i>Melica uniflora</i>	Einblütiges Perlgras		
<i>Oxalis acetosella</i>	Wald-Sauerklee		
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohrglanzgras		dominant
<i>Phragmites australis</i>	Schilf		
<i>Picea abies</i>	Fichte		
<i>Primula elatior</i>	Große Schlüsselblume *		
<i>Prunus padus</i>	Echte Traubenkirsche		
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche		
<i>Salix caprea</i>	Sal-Weide		
<i>Salix cinerea</i>	Grau-Weide		
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder		
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüßer Nachtschatten		
<i>Typha latifolia</i>	Breitblättriger Rohrkolben		

Kartierungsbogen			
Gemeinde: Rohlstorf	Kartierer: Gemperlein	Nr.: 84	Dat: 24.09.85
Biotoptyp:	Fließgewässer, Röhricht	Code:	FF, VR, VA, GH
Kurzbeschreibung:	Unterlauf der Bißnitz. Der kleine Flußlauf wird zwar noch wasserwirtschaftlich unterhalten, die natürlichen Mäander sind aber morphologisch weitgehend noch erhalten. An mehreren Stellen sind die Ufer eingebrochen. Zum Teil sind die den Bachlauf optisch beherrschenden Silber-Weiden zusammengebrochen und in die Bißnitz gestürzt. An dem steilen Ufer (die Bißnitz liegt ca. 1,5 bis 2,0 m unter Flur) dominiert ein Rohrglanzgras-Röhricht. Die Wasserstände schwanken also sehr stark. Im untersten Bereich gibt es einige kleine Gruppen der Teichrose. Im Gewässer wurden Fische gesichtet und am Gewässer Libellen..		
Botanischer Name	Deutscher Name	Gefährdung	Bemerkung
<i>Artemisia vulgaris</i>	Gemeiner Beifuß		
<i>Callitriche spec.</i>	Wasserstern		
<i>Calystegia sepium</i>	Schöne Zaunwinde		
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel		
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost		
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Gewöhnlicher Hohlzahn		
<i>Lamium album</i>	Weißes Taubnessel		
<i>Myosotis scorpioides</i>			
<i>Nuphar lutea</i>	Gelbe Teichrose	BArtSchV	
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohrglanzgras		dominant
<i>Rorippa amphibia</i>	Wasser-Sumpfkresse		
<i>Rorippa palustris</i>	Gemeine Sumpfkresse		
<i>Rumex conglomeratus</i>	Knäuelblütiger Ampfer		
<i>Salix alba</i>	Silber-Weide		dominant
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennnessel		dominant

Kartierungsbogen			
Gemeinde: Rohlstorf	Kartierer: Gemperlein	Nr.: 88	Dat: 11.07.85
Biotoptyp:	Stillgewässer	Code:	SM, VS, VR, WB, WE
Kurzbeschreibung:	Seebucht bei Warder mit großflächigen Teichrosenbeständen. Zum Ufer grenzt ein unterschiedlich breites Schilf-Röhricht an, das auf Flächen der Wasserwechselzone in ein Rohrglanz-Röhricht übergeht. Im Nordteil schließt sich ein schmaler Erlenbruchstreifen und auf dem höheren Ufer sowie auf der die Bucht abschirmenden Insel ein von Eschen beherrschter Laubholzmischwald an.		
Botanischer Name	Deutscher Name	Gefährdung	Bemerkung
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn		
<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle		dominant
<i>Alnus incana</i>	Grau-Erle		
<i>Caltha palustris</i>	Sumpfdotterblume		
<i>Carex acutiformis</i>	Sumpf-Segge		
<i>Crataegus monogyna</i> agg.	Eingriffeliger Weißdorn		
<i>Crepis paludosa</i>	Sumpf-Pippau		
<i>Epilobium hirsutum</i>	Zottiges Weidenröschen		
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost		
<i>Filipendula ulmaria</i>	Großes Mädesüß		
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewöhnliche Esche		dominant
<i>Geum rivale</i>	Bach-Nelkenwurz		
<i>Humulus lupulus</i>	Hopfen		
<i>Mentha aquatica</i>	Wasser-Minze		
<i>Nuphar lutea</i>	Gelbe Teichrose	BArtSchV	
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohrglanzgras		dominant
<i>Phragmites australis</i>	Schilf		dominant
<i>Primula elatior</i>	Große Schlüsselblume		
<i>Prunus padus</i>	Echte Traubenkirsche		
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche		
<i>Salix alba</i>	Silber-Weide		
<i>Salix cinerea</i>	Grau-Weide		
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder		
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Gewöhnliche Teichsimse		
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüßer Nachtschatten		
<i>Stachys palustris</i>	Sumpf-Ziest		
<i>Typha latifolia</i>	Breitblättriger Rohrkolben		
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennnessel		dominant
<i>Valeriana officinalis</i>	Echter Arznei-Baldrian		

Kartierungsbogen

Gemeinde: Rohlstorf	Kartierer: Gemperlein	Nr.: 89	Dat: 11.07.85
Biotoptyp:	Stillgewässer, Wald	Code:	SM, VS, VR, WM, WE
Kurzbeschreibung:	Mittlerer Teil des Wardersees mit auf dem Südufer durchgehendem und auf dem Nordufer unterbrochenem Waldsaum, der aus einem schmalen Erlenbruch, einem je nach Steilheit des Geländes mehr oder weniger flächig ausgebildeten (Erlen-) Eschen-Wald und auf dem Hochufer einem Buchenwald besteht. Westlich Rohlstorfs stockt in Ufernähe ein Pappel-Altbestand mit dichter Röhricht-Vegetation. Dem Waldsaum vorgelagert ist ein schmaler Röhrichtgürtel, der sich am Nordufer fragmentarisch auch an den landschaftlich genutzten Uferbereichen fortsetzt. Vor allem im westlichen Teil ist großflächig die Teichrosen-Gesellschaft ausgebildet.		

Botanischer Name	Deutscher Name	Gefährdung	Bemerkung
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn		
<i>Aegopodium podagraria</i>	Giersch		
<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle		dominant
<i>Anemone nemorosa</i>	Busch-Windröschen		
<i>Arum maculatum</i>	Geflecker Aronstab		
<i>Carex acutiformis</i>	Sumpf-Segge		
<i>Carpinus betulus</i>	Hainbuche		
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	Gegenblättriges Milzkraut		
<i>Corylus avellana</i>	Haselnuß		
<i>Crataegus monogyna</i> agg.	Eingriffeliger Weißdorn		
<i>Crepis paludosa</i>	Sumpf-Pippau		
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost		
<i>Fagus sylvatica</i>	Rotbuche		dominant
<i>Filipendula ulmaria</i>	Großes Mädesüß		
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewöhnliche Esche		dominant
<i>Geum rivale</i>	Bach-Nelkenwurz		
<i>Humulus lupulus</i>	Hopfen		
<i>Iris pseudacorus</i>	Sumpf-Schwertlilie	BArtSchV	
<i>Melica uniflora</i>	Einblütiges Perlgras		
<i>Milium effusum</i>	Flattergras		
<i>Myosoton aquaticum</i>	Wasserdarm		
<i>Nuphar lutea</i>	Gelbe Teichrose	BArtSchV	dominant
<i>Populus spec.</i>	Pappel		
<i>Phragmites australis</i>	Schilf		dominant
<i>Prunus padus</i>	Echte Traubenkirsche		
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche		
<i>Salix alba</i>	Silber-Weide		
<i>Salix cinerea</i>	Grau-Weide		
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder		
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Gewöhnliche Teichsimse		
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüßer Nachtschatten		
<i>Stellaria nemorum</i>	Wald-Sternmiere		
<i>Thalictrum flavum</i>	Gelbe Wiesenraute	3	
<i>Typha latifolia</i>	Breitblättriger Rohrkolben		
<i>Ulmus glabra</i>	Berg-Ulme		
<i>Valeriana officinalis</i>	Echter Arznei-Baldrian		

Kartierungsbogen

Gemeinde: Rohlstorf	Kartierer: Gemperlein	Nr.: 90	Dat: 11.07.85
Biotoptyp:	Wald	Code:	WM, WL
Kurzbeschreibung:	Eichenwald unterschiedlicher Ausprägung, der im Westen und Süden von einem bewachsenem Wall begrenzt wird. Am Ostrand steht eine Reihe alter Roßkastanien. Die Krautschicht ist im gesamten Gebiet nur schwach bis mäßig entwickelt.		

Botanischer Name	Deutscher Name	Gefährdung	Bemerkung
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn		
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Roßkastanie		
<i>Aegopodium podagraria</i>	Giersch		
<i>Anemone nemorosa</i>	Busch-Windröschen		
<i>Arum maculatum</i>	Geflecker Aronstab		
<i>Betula pendula</i>	Hänge-Birke		
<i>Carpinus betulus</i>	Hainbuche		
<i>Corylus avellana</i>	Haselnuß		
<i>Dryopteris filix mas</i>	Wurmfarn		
<i>Fagus sylvatica</i>	Rotbuche		
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewöhnliche Esche		
<i>Geum urbanum</i>	Echte Nelkenwurz		
<i>Glechoma hederacea</i>	Gundelrebe		
<i>Lamium galeobdolon</i>	Goldnessel		
<i>Milium effusum</i>	Flattergras		
<i>Oxalis acetosella</i>	Wald-Sauerklee		
<i>Prunus padus</i>	Echte Traubenkirsche		
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche		dominant
<i>Ranunculus auricomus</i> agg	Gold-Hahnenfuß		
<i>Ribes rubrum</i>	Rote Johannisbeere		
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder		
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche		
<i>Stachys spec.</i>	Ziest		
<i>Stachys sylvatica</i>	Wald-Ziest		
<i>Stellaria holostea</i>	Große Sternmiere		
<i>Tilia platyphyllos</i>	Sommer-Linde		
<i>Ulmus glabra</i>	Berg-Ulme		

Kartierungsbogen

Gemeinde: Rohlstorf	Kartierer: Gemperlein	Nr.: 101	Dat: 17.07.85
Biotoptyp:	Wald	Code:	WB, WM
Kurzbeschreibung:	Wald inmitten großer Getreidefelder. Der Wald wird von einer Hochspannungsleitung durchschnitten. Die Schneise wird als Wildacker genutzt. Der nördliche Teil (ca. 2/3 der Gesamtfläche) wird von einem ausgelichteten Erlenwald eingenommen, in dem in der üppigen Kraut-/Strauchschicht die Himbeere und die Kohldistel dominieren. Südlich der Schneise stockt ein dichter Eichen-Hasel-Wald, in dem die Schwarz-Erle recht häufig ist. Am Südostrand liegt ein gut strukturiertes Kleingewässer.		

Botanischer Name	Deutscher Name	Gefährdung	Bemerkung
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn		
<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle		dominant
<i>Alnus incana</i>	Grau-Erle		dominant
<i>Carex acutiformis</i>	Sumpf-Segge		
<i>Cirsium oleraceum</i>	Kohldistel		dominant
<i>Corylus avellana</i>	Haselnuß		
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Rasen-Schmieie		dominant
<i>Fagus sylvatica</i>	Rotbuche		
<i>Filipendula ulmaria</i>	Großes Mädesüß		
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewöhnliche Esche		
<i>Galium aparine</i>	Kletten-Labkraut		
<i>Geum rivale</i>	Bach-Nelkenwurz		
<i>Humulus lupulus</i>	Hopfen		
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Binse		
<i>Milium effusum</i>	Flattergras		
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohrglanzgras		
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Vielblütige Weißwurz		
<i>Potamogeton natans</i>	Schwimmendes Laichkraut		
<i>Primula elatior</i>	Große Schlüsselblume		
<i>Prunus padus</i>	Echte Traubenkirsche		
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche		
<i>Ribes rubrum</i> agg - <i>rubrum</i>	Rote Johannisbeere		
<i>Rubus idaeus</i>	Himbeere		dominant
<i>Salix alba</i>	Silber-Weide		
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder		
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Wald-Simse		
<i>Silene dioica</i>	Tag-Lichtnelke		
<i>Stachys sylvatica</i>	Wald-Ziest		
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennessel		

Kartierungsbogen			
Gemeinde: Rohlstorf	Kartierer: Gemperlein	Nr.: 102	Dat: 17.07.85
Biotoptyp:	Ruderalfluren, Gebüsch	Code:	GM, GH, WH
Kurzbeschreibung:	Nicht mehr genutzte Mergelgrube inmitten von Ackerflächen, die nach Osten geöffnet ist. Auf den z.T. sehr steilen Böschungen haben sich mehr oder weniger offene Wildrasenfluren eingestellt. Zu den Böschungskanten und -füßen treten Ruderalarten und Stickstoffzeiger verstärkt hinzu. Zum Teil sind kleine Gebüsche ausgebildet. In Teilbereichen ist fragmentarisch noch Pioniervegetation vorhanden. Die Fläche ist von Bedeutung für Insekten (insbesondere Schmetterlinge, Heuschrecken).		
Botanischer Name	Deutscher Name	Gefährdung	Bemerkung
<i>Achillea millefolium</i>	Gewöhnliche Schafgarbe		
<i>Agropyron repens</i>	Gewöhnliche Quecke		
<i>Agrostis tenuis</i>	Rotes-Straußgras		
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gewöhnliches Ruchgras		
<i>Arenaria serpyllifolia</i> agg	Quendelblättriges Sandkraut		
<i>Artemisia vulgaris</i>	Gemeiner Beifuß		
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume		
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel		
<i>Corylus avellana</i>	Haselnuß		
<i>Crepis capillaris</i>	Kleinköpfiger Pippau		
<i>Cynosurus cristatus</i>	Wiesen-Kammgras		
<i>Dactylis glomerata</i>	Wiesen-Knäuelgras		
<i>Festuca rubra</i>	Roter Schwingel		
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras		
<i>Hypericum perforatum</i>	Echtes Johanniskraut		
<i>Hypochoeris radicata</i>	Gewöhnliches Ferkelkraut		
<i>Lotus corniculatus</i>	Gewöhnlicher Hornklee		
<i>Odontites vulgaris</i>			
<i>Onopordum acanthium</i>	Eselsdistel	2	
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich		
<i>Prunella vulgaris</i>	Kleine Braunelle		
<i>Prunus spinosa</i>	Schwarzdorn		
<i>Rubus idaeus</i>	Himbeere		
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder *		
<i>Sedum telephium</i>	Große Fetthenne		
<i>Senecio vernalis</i>	Frühlings-Greiskraut		
<i>Silene alba</i>	Weißes Lichtnelke		
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn		
<i>Trifolium campestre</i>	Feld-Klee		
<i>Trifolium repens</i>	Kriechender Klee		
<i>Tussilago farfara</i>	Huflattich		
<i>Vicia sativa</i>	Schmalblättrige Wicke		

Kartierungsbogen			
Gemeinde: Rohlstorf	Kartierer: Gemperlein	Nr.: 103	Dat: 17.07.85
Biotoptyp:	Wald	Code:	WE, WB
Kurzbeschreibung:	Erlenwald inmitten intensiv landwirtschaftlich genutzter Flächen. Auf relativ trockenen Standorten dominiert die Grau-Erle, auf den feuchten Standorten die Schwarz-Erle. Der Westteil ist kahlgeschlagen worden. Bisher sind keine Aufforstungsmaßnahmen durchgeführt worden. Auf dieser Fläche dominiert die Himbeere.		
Botanischer Name	Deutscher Name	Gefährdung	Bemerkung
<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle		dominant
<i>Alnus incana</i>	Grau-Erle		dominant
<i>Carex acutiformis</i>	Sumpf-Segge		
<i>Circaea lutetiana</i>	Gewöhnliches Hexenkraut		
<i>Cirsium oleraceum</i>	Kohldistel		
<i>Corylus avellana</i>	Haselnuß		
<i>Crataegus monogyna</i> agg.	Eingriffeliger Weißdorn		
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost		
<i>Filipendula ulmaria</i>	Großes Mädesüß		
<i>Frangula alnus</i>	Faulbaum		
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewöhnliche Esche		
<i>Galium aparine</i>	Kletten-Labkraut		
<i>Glechoma hederacea</i>	Gundelrebe		
<i>Humulus lupulus</i>	Hopfen		
<i>Iris pseudacorus</i>	Sumpf-Schwertlilie	BArtSchV	
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gewöhnlicher Gilbweiderich		
<i>Milium effusum</i>	Flattergras		
<i>Paris quadrifolia</i>	Einbeere		
<i>Prunus padus</i>	Echte Traubenkirsche		
<i>Prunus spinosa</i>	Schwarzdorn		
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche		
<i>Rubus idaeus</i>	Himbeere		dominant
<i>Salix alba</i>	Silber-Weide		
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder *		
<i>Silene dioica</i>	Tag-Lichtnelke		
<i>Stellaria holostea</i>	Große Sternmiere		
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennnessel		
<i>Valeriana officinalis</i>	Echter Arznei-Baldrian		

Kartierungsbogen			
Gemeinde: Rohlstorf	Kartierer: Gemperlein	Nr.: 104	Dat: 17.07.85
Biotoptyp:	Röhricht	Code:	VR, SL
Kurzbeschreibung:	Schilfröhricht inmitten Weidegrünland. An seinem Nordostende liegt ein kleiner Tümpel, der nur eine spärliche Wasservegetation aufweist. Zum morphologisch stark ausgeprägten Rand der Quaalear Senke hin ist ein kleiner Erlenbestand ausgebildet, der allerdings keine gut ausgebildete Krautschicht aufweist.		
Botanischer Name	Deutscher Name	Gefährdung	Bemerkung
<i>Angelica sylvestris</i>	Wilde Engelwurz		
<i>Calamagrostis canescens</i>	Sumpf-Reitgras		
<i>Cirsium palustre</i>	Sumpf-Kratzdistel		
<i>Epilobium hirsutum</i>	Zottiges Weidenröschen		
<i>Galium uliginosum</i>	Moor-Labkraut	3	
<i>Iris pseudacorus</i>	Sumpf-Schwertlilie	BArtSchV	
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Binse		
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Kuckuckslichtnelke		
<i>Mentha aquatica</i>	Wasser-Minze		
<i>Peucedanum palustre</i>	Sumpf-Haarstrang		
<i>Phragmites australis</i>	Schilf		dominant
<i>Potamogeton natans</i>	Schwimmendes Laichkraut		
<i>Salix cinerea</i>	Grau-Weide		
<i>Salix viminalis</i>	Korb-Weide		
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Gewöhnliche Teichsimse		
<i>Sparganium erectum</i>	Aufrechter Igelkolben		
<i>Valeriana officinalis</i>	Echter Arznei-Baldrian		

Kartierungsbogen			
Gemeinde: Rohlstorf	Kartierer: Gemperlein	Nr.: 105	Dat: 17.07.85
Biototyp:	Röhricht, Gebüsch	Code:	WB, VR, WG
Kurzbeschreibung:	Inmitten der Quaalerteich-Niederung gelegener Biotop, der von Erlenbrüchen, Weidengebüsch und Schilfröhricht gebildet wird. Diese Biototypen durchdringen sich mosaikartig. Randlich vorgelagert sind Kohldistel- und andere Feuchtwiesen. Das Gebiet ist in den meisten Bereichen kaum begehbar und stellt daher einen wichtigen potentiellen Rückzugs- und Brutbiotop für zahlreiche Tierarten dar.		
Botanischer Name	Deutscher Name	Gefährdung	Bemerkung
<i>Aegopodium podagraria</i>	Giersch		
<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle		dominant
<i>Alnus incana</i>	Grau-Erle		
<i>Angelica sylvestris</i>	Wilde Engelwurz		
<i>Calamagrostis canescens</i>	Sumpf-Reitgras		
<i>Cirsium oleraceum</i>	Kohldistel		
<i>Cirsium palustre</i>	Sumpf-Kratzdistel		
<i>Crataegus monogyna</i> agg.	Eingriffeliger Weißdorn		
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost		
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewöhnliche Esche		
<i>Geum rivale</i>	Bach-Nelkenwurz		
<i>Iris pseudacorus</i>	Sumpf-Schwertlilie	BArtSchV	
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gewöhnlicher Gilbweiderich		
<i>Lythrum salicaria</i>	Blut-Weiderich		
<i>Phragmites australis</i>	Schilf		dominant
<i>Prunus padus</i>	Echte Traubenkirsche		
<i>Prunus spinosa</i>	Schwarzdorn		
<i>Ribes rubrum</i>	Rote Johannisbeere		
<i>Rosa canina</i>	Heckenrose		
<i>Salix alba</i>	Silber-Weide		
<i>Salix caprea</i>	Sal-Weide		dominant
<i>Salix cinerea</i>	Grau-Weide		dominant
<i>Salix spec.</i>	Weide		
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder		
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche *		

Kartierungsbogen			
Gemeinde: Rohlstorf	Kartierer: Gemperlein	Nr.: 108	Dat: 01.10.85
Biotoptyp:	Wald	Code:	WM, WB
Kurzbeschreibung:	Recht gut strukturierter (Kraut- und Strauchschicht) Laubholzbestand, in dem in großen Teilen die Esche dominiert. In den feuchten Senken sind zum Teil noch Erlenbrüche ausgebildet, in denen die Sumpf-Segge dominiert. In großen Bereichen wurde mit Grau-Erle aufgeforstet. Das Gebiet hat eine recht ausgeprägte Reliefenergie, die z.T. durch künstliche Wälle (alte Grenzwälle?) geschaffen wurde. Fragmentarisch ist der Eichen-Hainbuchen-Wald erhalten.		
Botanischer Name	Deutscher Name	Gefährdung	Bemerkung
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn		
<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle		dominant
<i>Alnus incana</i>	Grau-Erle		dominant
<i>Anemone nemorosa</i>	Busch-Windröschen		
<i>Arum maculatum</i>	Geflecker Aronstab		
<i>Calamagrostis canescens</i>	Sumpf-Reitgras		
<i>Carex acutiformis</i>	Sumpf-Segge		dominant
<i>Carpinus betulus</i>	Hainbuche		
<i>Cirsium oleraceum</i>	Kohldistel		
<i>Corylus avellana</i>	Haselnuß		
<i>Crataegus laevigata</i>	Zweiggriffeliger Weißdorn		
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Rasen-Schmieie		
<i>Epipactis helleborine</i>	Breitblättrige Stendelwurz	BArtSchV	
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost		
<i>Fagus sylvatica</i>	Rotbuche		
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewöhnliche Esche		dominant
<i>Galium palustre</i>	Sumpf-Labkraut		
<i>Geum urbanum</i>	Echte Nelkenwurz		
<i>Iris pseudacorus</i>	Sumpf-Schwertlilie	BArtSchV	
<i>Lamium galeobdolon</i>	Goldnessel		
<i>Listera ovata</i>	Großes Zweiblatt		
<i>Lycopus europaeus</i>	Ufer-Wolfstrapp		
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gewöhnlicher Gilbweiderich		
<i>Milium effusum</i>	Flattergras		
<i>Orchis mascula</i>	Großes Knabenkraut *	3	
<i>Platanthera chlorantha</i>	Berg-Waldhyazinthe	3	
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Vielblütige Weißwurz		
<i>Prunus padus</i>	Echte Traubenkirsche		
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche		
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder		
<i>Scutellaria galericulata</i>	Sumpf-Helmkraut		
<i>Silene dioica</i>	Tag-Lichtnelke		
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüßer Nachtschatten		
<i>Stachys sylvatica</i>	Wald-Ziest		

Kartierungsbogen			
Gemeinde: Rohlstorf	Kartierer: Gemperlein	Nr.: 111	Dat: 24.09.85
Biototyp:	Linden-Allee	Code:	WH
Kurzbeschreibung:	Allee-System bei Gut Rohlstorf. Die Alleen bestehen fast ausschließlich aus Linden und sind landschaftsprägende Linienelemente. Die Gesamtlänge des Allee-Systems ist ca. 4.200 m. In Teilbereichen sind ausgefallene Alleebäume durch Neupflanzungen ersetzt worden. Die Fahrspuren sind asphaltiert (z.T. Kreisstraßen, z.T. Fahrwege auf dem Gutsgelände).		
Botanischer Name	Deutscher Name	Gefährdung	Bemerkung
Tilia	Linde		

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 1 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 09.10.95

Länge bzw. Durchmesser: 30 m Breite: 5 m Tiefe: cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **fehlend**, wobei die Beschattung zwischen **0 - 30%** liegt. Die Gewässertrophie ist **nicht einschätzbar** und es befindet sich im **Jugendstadium**.
Es ist damit einzustufen als **naturfern**

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer wurde als Abwasserklärbecken angelegt.

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

neu angelegt, steile Uferböschung (3m),
Flutrasen

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

+

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 2 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 11.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 10 m Breite: 4 m Tiefe: 0 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist fehlend und der Gehölzgürtel ist dicht im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Altersstadium mit Verlandungszonen. Es ist damit einzustufen als beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Das Stillgewässer wird durch Schnittgut- oder Buschablagerungen beeinträchtigt.
Das Stillgewässer ist mit großflächigen Feldsteinablagerungen verfüllt.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Westen ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Alnus glutinosa
Corylus avellana
Salix spec.
Sambucus nigra
Fraxinus excelsior

Schwarz-Erle
Haselnuß
Weide
Schwarzer Holunder
Gemeine Esche

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 3 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 11.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 35 m Breite: 20 m Tiefe: 0 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: 0 m

Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist lückig im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Altersstadium mit Verlandungszonen. Es ist damit einzustufen als naturnah und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

Röhricht: Verlandung durch Phragmitis und Carex

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Alnus glutinosa

Schwarz-Erle

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Iris pseudacorus

Sumpf-Schwertlilie

+

Gräser, Simsen und Binsen

Carex spec.

Segge

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 4 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 07.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 20 m Breite: 10 m Tiefe: 100 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **lückig** im Umkreis , wobei die Beschattung zwischen **30 - 60%** liegt. Die Gewässertrophie ist **nicht einschätzbar** und es befindet sich im Reifestadium.
Es ist damit einzustufen als **beeinträchtigt** und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer ist ein Fischteich.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Süden Ackernutzung statt.

In Nachbarschaft zum Stillgewässer findet im Nordwesten Weidenutzung statt.

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Osten ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Zygoptera-Larven, Aeshna, Notonecta, Nepa cinerea

Mollusken

Gehölze

Salix spec.

Quercus robur

Betula spec.

Abies spec.

Weide

Stiel-Eiche

Birke

Tanne

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Spirodela polymorpha

Lemna minor

* *Epilobium spec.*

Potamogeton natans

Teichlinse

Kleine Wasserlinse

Weidenröschen

Schwimmendes Laichkraut

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 5 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 10.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 50 m Breite: 40 m Tiefe: 100 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist fehlend, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.
Es ist damit einzustufen als naturfern

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer wurde als Abwasserklärbecken angelegt.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Zygoptera, Anisoptera

Mollusken

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Iris pseudacorus

Sumpf-Schwertlilie

Lemna minor

Kleine Wasserlinse

*

Potamogeton natans

Schwimmendes Laichkraut

Ceratophyllum submersum

Zartes Hornkraut

Gräser, Simsen und Binsen

Juncus spec.

Binse

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 6 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 10.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 15 m Breite: 15 m Tiefe: 80 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: 1 m

Der Röhrichtgürtel ist lückig und der Gehölzgürtel ist fehlend, wobei die Beschattung zwischen

0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.

Es ist damit einzustufen als beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer ist als Weiher entstanden.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Osten Ackernutzung statt.

ev. Karpfen

In Nachbarschaft zum Stillgewässer findet im Umkreis Weidenutzung statt.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Zygoptera-Larve, Notonecta

Mollusken

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

+

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 7 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 10.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 20 m Breite: 20 m Tiefe: 80 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist dicht im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 30 - 60% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer wurde als Ton/Kiesgrube angelegt.

Beeinträchtigungen

Das Gewässer ist ein Fischteich.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

Kiesabbau, Uferböschung 1 m steil, Wasser sehr klar, ruderaler Grasflur

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Umkreis ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Abies spec.

Tanne

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Sparganium erectum

Aufrechter Igelkolben

Potamogeton natans

Schwimmendes Laichkraut

+ *Sparganium spec.*

Igelkolben

Gräser, Simsen und Binsen

Carex spec.

Segge

Schoenoplectus lacustris a Gewöhnliche Teichsimse

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 8 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 10.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 40 m Breite: 25 m Tiefe: 120 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **dicht** im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen **0 - 30%** liegt. Die Gewässertrophie ist **nicht einschätzbar** und es befindet sich im **Reifestadium**.
Es ist damit einzustufen als **beeinträchtigt**

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer wurde als Regenklär- oder Regenrückhaltebecken angelegt.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

breiter Ruderal- und Gehölzstreifen, außen um den Gehölzstreifen Ringdrainage, Algenwatten, offener Grabenzufluß

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Norden ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Spirodela polyrrhiza

Teichlinse

+

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 9 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 16.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 50 m Breite: 35 m Tiefe: 40 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist lückig und der Gehölzgürtel ist fehlend, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.
Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer wurde als Teichbiotop angelegt.

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Die Gewässernachbarnutzung besteht im Umkreis aus Wiese oder Brache.

Bemerkungen

starke Verlandungstendenzen,
Ruderalvegetation

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Das Stillgewässer ist ein potentieller Laichplatz der Erdkröte (*Bufo bufo*).

Insekten

Mollusken

juv. *Rana*

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Alisma plantago-aquatica

Gewöhnlicher Froschlöffel

Typha latifolia

Breitblättriger Rohrkolben

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 10 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 16.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 40 m Breite: 20 m Tiefe: 60 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **fehlend**, wobei die Beschattung zwischen **0 - 30%** liegt. Die Gewässertrophie ist **nicht einschätzbar** und es befindet sich im **Relfestadium**.

Es ist damit einzustufen als **teilweise beeinträchtigt** und nach § 15 a **Landesnaturenschutzgesetz geschützt**.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer wurde als Teichbiotop angelegt.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

Die Gewässernachbarnutzung besteht im Umkreis aus Wiese oder Brache.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Anisoptera-Larven, Argyroneta aquatica

Mollusken

viel Schneckenlaich

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Potamogeton natans

Schwimmendes Laichkraut

* *Typha latifolia*

Breitblättriger Rohrkolben

Gräser, Simsen und Binsen

Juncus effusus

Flatter-Binse

Juncus conglomeratus

Knäuel-Binse

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 11 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 16.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 35 m Breite: 25 m Tiefe: 70 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist fehlend, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Relfestadium.

Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer wurde als Teichbiotop angelegt.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

Die Gewässernachbarnutzung besteht im Umkreis aus Wiese oder Brache.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Das Stillgewässer ist ein potentieller Laichplatz der Erdkröte (*Bufo bufo*).

Insekten

Mollusken

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Gewöhnlicher Froschlöffel
<i>Potamogeton natans</i>	Schwimmendes Laichkraut
* <i>Sparganium erectum</i>	Aufrechter Igelkolben
<i>Mentha aquatica</i>	Wasser-Minze
<i>Veronica beccabunga</i>	Bachbunge
<i>Equisetum spec.</i>	Schachtelhalm
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost
<i>Myriophyllum spec.</i>	Tausendblatt
<i>Hottonia palustris</i>	Wasserfeder

Gräser, Simsen und Binsen

Juncus effusus Flatter-Binse

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 12 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 14.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 50 m Breite: 30 m Tiefe: 50 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist dicht im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Altersstadium mit Verlandungszonen. Es ist damit einzustufen als naturnah und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer ist als Weiher entstanden.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Fraxinus excelsior

Alnus glutinosa

Fagus sylvatica

Gemeine Esche

Schwarz-Erle

Rotbuche

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Mentha aquatica

Iris pseudacorus

Eupatorium cannabinum

Wasser-Minze

Sumpf-Schwertlilie

Wasserdost

Gräser, Simsen und Binsen

Carex spec.

Glyceria maxima

Segge

Wasser-Schwaden

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 13 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 14.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 80 m Breite: 15 m Tiefe: 80 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist lückig und der Gehölzgürtel ist dicht im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 30 - 60% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer wurde als Abwasserklärbecken angelegt.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Umkreis ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Notonecta

Mollusken

Gehölze

Salix spec.

Weide

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Petasites hybridus

Rote Pestwurz

* *Epilobium spec.*

Weidenröschen

Lythrum salicaria

Blut-Weiderich

Gräser, Simsen und Binsen

Juncus effusus

Flatter-Binse

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 14 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 14.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 50 m Breite: 15 m Tiefe: 80 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist fehlend und der Gehölzgürtel ist dicht im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 30 - 60% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.
Es ist damit einzustufen als naturfern

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer wurde als Regenklär- oder Regenrückhaltebecken angelegt.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Umkreis ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Urtica dioica

Große Brennnessel

+

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 15 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 14.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 75 m Breite: 20 m Tiefe: 100 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: 0 m

Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist fehlend, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.

Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

zwei tiefe steile Böschungen mit Ruderalflur, anoxische Uferzone

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

<i>Spirodela polyrrhiza</i>	Teichlinse
<i>Potamogeton natans</i>	Schwimmendes Laichkraut
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Gewöhnlicher Froschlöffel
<i>Sparganium erectum</i>	Aufrechter Igelkolben
<i>Iris pseudacorus</i>	Sumpf-Schwertlilie
<i>Lycopus europaeus</i>	Ufer-Wolfstrapp
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost
<i>Mentha aquatica</i>	Wasser-Minze

Gräser, Simsen und Binsen

Eleocharis palustris agg. Gewöhnliche Sumpfpbinse
Schoenoplectus lacustris a Gewöhnliche Teichsimse

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 17 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 22.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 30 m Breite: 75 m Tiefe: 100 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist fehlend, wobei die Beschattung zwischen 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Relfestadium.

Es ist damit einzustufen als naturnah und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

sehr gut ausgebildeter Waldtümpel

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Umkreis ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

versch. Wasserkäfer, Dytiscus, , Nepidae

Mollusken

Triturus

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

<i>Potamogeton natans</i>	Schwimmendes Laichkraut
<i>Ceratophyllum submersum</i>	Zartes Hornkraut
<i>Lemna minor</i>	Kleine Wasserlinse
<i>Lemna trisulca</i>	Dreifurchige Wasserlinse
<i>Spirodela polyrrhiza</i>	Teichlinse
<i>Potamogeton x zizii</i>	Schmalblättriges Laichkraut

Gräser, Simsen und Binsen

<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Binse
<i>Glyceria fluitans agg</i>	Flutender Schwaden

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 18 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 10.10.95

Länge bzw. Durchmesser: 15 m Breite: m Tiefe: 0 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist fehlend und der Gehölzgürtel ist dicht im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.

Es ist damit einzustufen als beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

+

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 19 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 09.10.95

Länge bzw. Durchmesser: 20 m Breite: 12 m Tiefe: 120 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist dicht im Westen, wobei die Beschattung zwischen 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium. Es ist damit einzustufen als beeinträchtigt

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Kleingewässer ist ein Feuerlöschteich.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

Wasser stinkt nach Faulgasen

Im Westen des Gewässers befindet sich eine Siedlung bzw. Gärten.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Fraxinus excelsior

Gemeine Esche

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Iris pseudacorus

Sumpf-Schwertlilie

Spirodela polyrrhiza

Teichlinse

Potamogeton spec.

Laichkraut

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 20 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 21.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 30 m Breite: 10 m Tiefe: 80 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist fehlend wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist eu- bis hypertroph und es befindet sich im Reifestadium. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Das Gewässer ist eine Viehtränke.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

In Nachbarschaft zum Stillgewässer findet im Umkreis Weidenutzung statt.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Das Stillgewässer ist ein potentieller Laichplatz der Erdkröte (*Bufo bufo*).

Insekten

Zygoptera-Larven, Sympetrum, Enallagma cyathigerum

Mollusken

Triturus-Larven, Rana juv.

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

<i>Polygonum amphibium</i>	Wasser-Knöterich
<i>Elodea canadensis</i>	Kanadische Wasserpest
* <i>Ranunculus spec.</i>	Hahnenfuß
<i>Lemna trisulca</i>	Dreifurchige Wasserlinse
<i>Lemna minor</i>	Kleine Wasserlinse
<i>Potamogeton natans</i>	Schwimmendes Laichkraut
<i>Sparganium erectum</i>	Aufrechter Igelkolben
<i>Oenanthe aquatica</i>	Wasserfenchel

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 21 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 07.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 30 m Breite: 20 m Tiefe: 150 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist lückig im Norden, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Das Stillgewässer ist beeinträchtigt durch Viehvertritt

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft zum Stillgewässer findet im Umkreis Weidenutzung statt.

Bemerkungen

Algenwatten, im Norden und Osten steile Uferböschung (Ruderalflur), Zaun an Böschungskante

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

div. Wasserkäfer und Wanzen, Zygoptera-Larven, Anisoptera-Larven

Mollusken

div. Schnecken, Teichmuschel

Gehölze

Salix spec. Weide
Crataegus monogyna agg. Eingriffeliger Weißdorn

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

<i>Potamogeton natans</i>	Schwimmendes Laichkraut
<i>Lemna minor</i>	Kleine Wasserlinse
<i>Sparganium erectum</i>	Aufrechter Igelkolben
<i>Typha latifolia</i>	Breitblättriger Rohrkolben
<i>Lycopus europaeus</i>	Ufer-Wolfstrapp

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 22 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 07.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 25 m Breite: 18 m Tiefe: 50 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist dicht im Westen, wobei die Beschattung zwischen 30 - 60% liegt. Die Gewässertrophie ist eu- bis hypertroph und es befindet sich im Altersstadium mit Verlandungszonen. Es ist damit einzustufen als naturnah und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Westen Ackernutzung statt.

Bemerkungen

Grabentümpel verlandet

Im Nordosten des Gewässers befindet sich eine Siedlung bzw. Gärten.
Im Süden des Gewässers verläuft eine Straße oder ein Weg.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Libellen

Mollusken

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Epilobium spec.

Weidenröschen

• *Hottonia palustris*

Wasserfeder

Lythrum salicaria

Blut-Weiderich

Solanum dulcamara

Bittersüßer Nachtschatten

Gräser, Simsen und Binsen

Phragmites australis

Schilf

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 23 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 10.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 25 m Breite: 15 m Tiefe: 80 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: 5 m

Der Röhrichtgürtel ist spärlich und der Gehölzgürtel ist lückig im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer wurde als Teichbiotop angelegt.

Das Kleingewässer ist ein Feuerlöschteich.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

ca 10 - 15 Jahre alt

Im Norden des Gewässers verläuft eine Straße oder ein Weg.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Salix spec.

Weide

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Urtica dioica

Große Brennnessel

* *Epilobium spec.*

Weidenröschen

Sonchus spec.

Gänsedistel

Cirsium spec.

Kratzdistel

Iris pseudacorus

Sumpf-Schwertlilie

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 24 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 10.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 25 m Breite: 20 m Tiefe: 80 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: 3 m

Der Röhrichtgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **fehlend**, wobei die Beschattung zwischen

0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist **nicht einschätzbar** und es befindet sich im **Jugendstadium**.

Es ist damit einzustufen als **beeinträchtigt**

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer ist ein Fischteich.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

rechteckige Teichanlage, Pionierstadium,
steile Uferkanten

Im Norden des Gewässers verläuft eine Straße oder ein Weg.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

+

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 25 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 10.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 40 m Breite: 40 m Tiefe: 70 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist spärlich und der Gehölzgürtel ist lückig im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 30 - 60% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer wurde als Teichbiotop angelegt.

Beeinträchtigungen

Es ist derzeit keine Nutzung erkennbar.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

"wilde" Fischbesiedlung, guter Gehölzsaum, eine Drainage fährt durch den Teich, zwei Inseln

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Graugans BV, Stockente BV, Schellente BV, Bläuhuhn BV, Teichhuhn BV

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

+

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 26 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 10.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 7 m Breite: m Tiefe: 100 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: 1 m
Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist fehlend, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Altersstadium mit Verlandungszonen. Es ist damit einzustufen als beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

9-stacheliger Stichling

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Wasserkäfer

Mollusken

Lymnea peregra f. ovata

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

+

Gräser, Simsen und Binsen

Agrostis stolonifera Weißes Straußgras

Glyceria maxima Wasser-Schwaden

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 27 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 10.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 6 m Breite: m Tiefe: 150 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **dicht** im Westen, wobei die Beschattung zwischen 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist **nicht einschätzbar** und es befindet sich im **Reifestadium**. Es ist damit einzustufen als **teilweise beeinträchtigt** und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Das Stillgewässer wird durch Schnittgut- oder Buschablagerungen beeinträchtigt.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

"grundloses Loch", stinkendes Wasser, eudominanter *Urtica*-Gürtel, keine Schutzzone

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Salix spec.

Weide

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Urtica dioica

Große Brennessel

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 28 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 03.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 30 m Breite: 20 m Tiefe: 100 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **lückig** im **Umkreis**, wobei die Beschattung zwischen **30 - 60%** liegt. Die Gewässertrophie ist **nicht einschätzbar** und es befindet sich im **Reifestadium**.
Es ist damit einzustufen als **teilweise beeinträchtigt** und nach § 15 a **Landesnaturenschutzgesetz geschützt**.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im **Umkreis** **Ackernutzung** statt.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Anisoptera-Larven, Notonecta spec.1, Notonecta spec.2

Mollusken

Triturus, Rana juv.

Gehölze

<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche
<i>Salix spec.</i>	Weide
<i>Crataegus monogyna agg.</i>	Eingriffeliger Weißdorn
<i>Prunus spinosa</i>	Schwarzdorn
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

<i>Myosotis palustris agg.</i>	Sumpf-Vergißmeinnicht
★ <i>Spirodela polyrrhiza</i>	Teichlinse

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 29 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 14.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 18 m Breite: 8 m Tiefe: 120 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
 Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist lückig im Westen, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Altersstadium mit Verlandungszonen. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Anisoptera-Larven, Dytiscus marginalis, Notonecta, Nepidae

Mollusken

Triturus

Planorbarius

Gehölze

Quercus robur

Stiel-Eiche

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Alisma plantago-aquatica

Gewöhnlicher Froschlöffel

* *Iris pseudacorus*

Sumpf-Schwertlilie

Sparganium erectum

Aufrechter Igelkolben

Lycopus europaeus

Ufer-Wolfstrapp

Spirodela polyrrhiza

Teichlinse

Gräser, Simsen und Binsen

Agrostis stolonifera

Weißes Straußgras

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 30 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 11.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 10 m Breite: m Tiefe: 80 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichgürtel ist lückig und der Gehölzgürtel ist lückig im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Altersstadium mit Verlandungszonen. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze
Salix spec.

Weide

Kräuter mit Röhrich- und Wasservegetation

+

Gräser, Simsen und Binsen

Phalaris arundinacea Rohrglanzgras
Carex pseudocyperus Scheinzyper-Segge

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 31 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 11.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 10 m Breite: 8 m Tiefe: 80 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
 Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist lückig im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.
 Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Libellen, Libellen-Larven ?, Käfer, Notonecta, Nepidae

Mollusken

Triturus

Gehölze

Alnus glutinosa

Salix spec.

Schwarz-Erle

Weide

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Alisma plantago-aquatica

* *Potamogeton natans*

Mentha aquatica

Gewöhnlicher Froschlöffel

Schwimmendes Laichkraut

Wasser-Minze

Gräser, Simsen und Binsen

Carex pseudocyperus

Schoenoplectus lacustris a

Phalaris arundinacea

Scheinzyper-Segge

Gewöhnliche Teichsimse

Rohrglanzgras

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 32 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 22.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 25 m Breite: 15 m Tiefe: 150 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **dicht im Umkreis**, wobei die Beschattung zwischen **60 - 100%** liegt. Die Gewässertrophie ist **nicht einschätzbar** und es befindet sich im **Reifestadium**.

Es ist damit einzustufen als **naturnah** und nach § 15 a **Landesnaturenschutzgesetz geschützt**.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

starker Laubfall

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Umkreis ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Lemna minor

Kleine Wasserlinse

• *Spirodela polyrrhiza*

Teichlinse

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 33 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 22.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 22 m Breite: m Tiefe: 150 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **dicht** im **Umkreis**, wobei die Beschattung zwischen **60 - 100%** liegt. Die Gewässertrophie ist **nicht einschätzbar** und es befindet sich im **Reifestadium**.
Es ist damit einzustufen als **teilweise beeinträchtigt** und nach § 16 a **Landesnaturschutzgesetz geschützt**.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

Nadelforst

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Umkreis ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Anisoptera-Larven, Zygoptera-Larven

Mollusken

Triturus

Gehölze

Alnus glutinosa

Picea spec.

Schwarz-Erle

Fichte

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Lemna trisulca

• *Spirodela polyrrhiza*

Potamogeton natans

Dreifurchige Wasserlinse

Teichlinse

Schwimmendes Laichkraut

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 34 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 04.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 8 m Breite: 4 m Tiefe: 10 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist spärlich und der Gehölzgürtel ist dicht im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist eu- bis hypertroph und es befindet sich im Reifestadium.
Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Dytiscus marginalis, Nepidae, Wasserflöhe

Mollusken

Nacktschnecken

Gehölze

Alnus glutinosa

Schwarz-Erle

Salix spec.

Weide

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Alisma plantago-aquatica

Gewöhnlicher Froschlöffel

• *Galium palustre*

Sumpf-Labkraut

Sparganium erectum

Aufrechter Igelkolben

Solanum dulcamara

Bittersüßer Nachtschatten

Urtica dioica

Große Brennnessel

Gräser, Simsen und Binsen

Phalaris arundinacea

Rohrglanzgras

Glyceria fluitans agg.

Flutender Schwaden

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 35 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 04.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 12 m Breite: 6 m Tiefe: 150 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
 Der Röhrichtgürtel ist spärlich und der Gehölzgürtel ist lückig im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.
 Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Nordwesten Ackernutzung statt.

In Nachbarschaft zum Stillgewässer findet im Südosten Weidenutzung statt.

Bemerkungen

steile hohe Böschung

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Anisoptera-Larven, Wasserkäfer

Mollusken

Planorbarius

Triturus juv., Anura juv.

Gehölze

Alnus glutinosa

Schwarz-Erle

Salix spec.

Weide

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Mentha aquatica

Wasser-Minze

* *Lycopus europaeus*

Ufer-Wolfstrapp

Typha latifolia

Breitblättriger Rohrkolben

Lythrum salicaria

Blut-Weiderich

Solanum dulcamara

Bittersüßer Nachtschatten

Sonchus spec.

Gänsedistel

Urtica dioica

Große Brennnessel

Lysimachia vulgaris

Gemeiner Gilbweiderich

Galeopsis spec.

Hohlzahn

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 36 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 26.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 50 m Breite: 30 m Tiefe: 100 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
 Der Röhrichgürtel ist spärlich und der Gehölzgürtel ist fehlend, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.
 Es ist damit einzustufen als naturfern

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer wurde als Abwasserklärbecken angelegt.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Norden Ackernutzung statt.

In Nachbarschaft zum Stillgewässer findet im Süden Weidenutzung statt.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Daphnien, Notonecta, Wasserkäfer

Mollusken

Gehölze

Kräuter mit Röhrich- und Wasservegetation

<i>Typha latifolia</i>	Breitblättriger Rohrkolben
* <i>Alisma plantago-aquatica</i>	Gewöhnlicher Froschlöffel
<i>Lemna minor</i>	Kleine Wasserlinse

Gräser, Simsen und Binsen

Schoenoplectus lacustris a Gewöhnliche Teichsimse
Juncus effusus Flatter-Binse

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 37 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 08.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 12 m Breite: 12 m Tiefe: 100 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist spärlich und der Gehölzgürtel ist dicht im Norden, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium. Es ist damit einzustufen als beeinträchtigt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Kleingewässer ist ein Feuerlöschteich.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

Argyroneta aquatica

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Nepidae, Wasserkäfer

Mollusken

Lymnea

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

<i>Potamogeton natans</i>	Schwimmendes Laichkraut
• <i>Spirodela polyrrhiza</i>	Teichlinse
<i>Lemna trisulca</i>	Dreifurchige Wasserlinse
<i>Iris pseudacorus</i>	Sumpf-Schwertlilie
<i>Sparganium erectum</i>	Aufrechter Igelkolben

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 38 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 08.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 25 m Breite: 8 m Tiefe: 60 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
 Der Röhrichtgürtel ist spärlich und der Gehölzgürtel ist dicht im Süden, wobei die Beschattung zwischen 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.
 Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

"Bombenartiger" Trichter, 3m steile Uferböschung

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Nepidae, Notonecta, Wasserkäfer, breite Wanzen, Anisoptera-Larven, Zygoptera-Larven

Mollusken

Gehölze

<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle
<i>Corylus avellana</i>	Haselnuß
<i>Picea spec.</i>	Fichte
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

<i>Lemna minor</i>	Kleine Wasserlinse
• <i>Lemna trisulca</i>	Dreifurchige Wasserlinse
<i>Potamogeton natans</i>	Schwimmendes Laichkraut
<i>Sparganium erectum</i>	Aufrechter Igelkolben
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Gewöhnlicher Froschlöffel

Gräser, Simsen und Binsen

Schoenoplectus lacustris a Gewöhnliche Teichsimse

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 39 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 10.10.95

Länge bzw. Durchmesser: 40 m Breite: 12 m Tiefe: 5 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **dicht** im **Umkreis**, wobei die Beschattung zwischen **60 - 100%** liegt. Die Gewässertrophie ist **nicht einschätzbar** und es befindet sich im **Altersstadium mit Verlandungszonen**. Es ist damit einzustufen als **teilweise beeinträchtigt** und nach § 15 a **Landesnaturenschutzgesetz geschützt**.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Das Stillgewässer ist durch Müllablagerungen belastet.

Das Stillgewässer ist mit großflächigen Feldsteinablagerungen verfüllt.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis **Ackernutzung** statt.

Bemerkungen

hohe gerade Abbruchkanten, ev. im Winter Regenauffangbecken

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Norden **ein Knick oder Gehölz**.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Populus spec.

Pappel

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

+

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 40 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 10.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 60 m Breite: 20 m Tiefe: 150 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist dicht im Nordwesten, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Altersstadium mit Verlandungszonen. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Südosten Ackernutzung statt.

Bemerkungen

fast völlig verlandet, Wasserspinnen, viele Egel, Asseln

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Nordwesten ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Furchenschwimmer, großer Gelbrandkäfer, kleine Schwimmkäfer

Mollusken

Posthornschncke

Gehölze

Gräser, Simsen und Binsen

Agrostis stolonifera Weißes Straußgras
Carex pseudocyperus Scheinzyper-Segge

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

<i>Spirodela polyrrhiza</i>	Teichlinse
* <i>Iris pseudacorus</i>	Sumpf-Schwertlilie
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Gewöhnlicher Froschlöffel
<i>Typha latifolia</i>	Breitblättriger Rohrkolben
<i>Galium palustre</i>	Sumpf-Labkraut
<i>Sparganium erectum</i>	Aufrechter Igelkolben
<i>Lycopus europaeus</i>	Ufer-Wolfstrapp
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gemeiner Gilbweiderich
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüßer Nachtschatten

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 41 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 03.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 20 m Breite: 15 m Tiefe: 0 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist dicht im Südosten, wobei die Beschattung zwischen 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Altersstadium mit Verlandungszonen. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Nordwesten Ackernutzung statt.

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Südosten ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Das Stillgewässer ist ein potentieller Laichplatz der Erdkröte (*Bufo bufo*).

Insekten

Mollusken

Rana juv.

Gehölze

Alnus glutinosa

Salix spec.

Schwarz-Erle

Weide

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Iris pseudacorus

+ *Solanum dulcamara*

Myosotis spec.

Stachys spec.

Galium spec.

Sumpf-Schwertlilie

Bittersüßer Nachtschatten

Vergißmeinnicht

Ziest

Labkraut

Gräser, Simsen und Binsen

Phalaris arundinacea

Phragmites australis

Rohrglanzgras

Schilf

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 42 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 03.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 25 m Breite: 10 m Tiefe: 30 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist lückig im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.
Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Das Stillgewässer ist beeinträchtigt durch Drainage

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

<i>Sparganium erectum</i>	Aufrechter Igelkolben
* <i>Oenanthe aquatica</i>	Wasserfenchel
<i>Lythrum salicaria</i>	Blut-Weiderich
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüßer Nachtschatten

Gräser, Simsen und Binsen

<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohrglanzgras
<i>Schoenoplectus lacustris</i> a	Gewöhnliche Teichsimse
<i>Carex spec.</i>	Segge

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 43 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 03.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 20 m Breite: m Tiefe: cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist fehlend und der Gehölzgürtel ist dicht im Norden, wobei die Beschattung zwischen 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

30 m breite Böschung, Feldgehölzinsel mit "Krater", 4 - 5 m tief, 50 m westl. weitere Feldgehölze

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Fraxinus excelsior

Acer spec.

Tilia spec.

Gemeine Esche

Ahorn

Linde

+

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 44 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 10.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 25 m Breite: 8 m Tiefe: 100 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist spärlich und der Gehölzgürtel ist fehlend, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Altersstadium mit Verlandungszonen. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

Wasserskorpion, am 22.8.95: Restfläche Wasser 5 m², viele sterbende Schlammschnecken

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Dytiscus, Sympetrum, Lestes, Notonecta, viele winzige Wasserkäfer

Mollusken

Schlammschnecken

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüßer Nachtschatten
<i>Sparganium erectum</i>	Aufrechter Igelkolben
<i>Lycopus europaeus</i>	Ufer-Wolfstrapp
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Gewöhnlicher Froschlöffel
<i>Lemna trisulca</i>	Dreifurchige Wasserlinse
<i>Potamogeton natans</i>	Schwimmendes Laichkraut
<i>Spirodela polyrrhiza</i>	Teichlinse

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 45 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 10.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 25 m Breite: 8 m Tiefe: 200 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
 Der Röhrichtgürtel ist fehlend und der Gehölzgürtel ist dicht im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.
 Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturenschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Wasserscorpion, Bruchholz, am 22.8.95: 20 m² Wasserfläche

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Notonecta, Anisoptera-Larve, Furchenschwimmer, Libellen-Flug

Mollusken

Rana juv.

Gehölze

Quercus robur
Prunus spinosa
Salix spec.

Stiel-Eiche
 Schwarzdorn
 Weide

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Lemna minor Kleine Wasserlinse
Oenanthe aquatica Wasserfenchel
Lycopus europaeus Ufer-Wolfstrapp
Solanum dulcamara Bittersüßer Nachtschatten

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 46 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 10.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 30 m Breite: 20 m Tiefe: 80 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist dicht im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist eu- bis hypertroph und es befindet sich im Reifestadium.

Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer wurde als Ton/Kiesgrube angelegt.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

Nutzung als Drainagetümpel, Verlandungsgefahr durch Phragmitis, sauberes klares Wasser

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Sichtungen

Gehölze

Salix spec.

Weide

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

<i>Typha latifolia</i>	Breitblättriger Rohrkolben
<i>Potamogeton natans</i>	Schwimmendes Laichkraut
<i>Hottonia palustris</i>	Wasserfeder
<i>Iris pseudacorus</i>	Sumpf-Schwertlilie
<i>Lemna minor</i>	Kleine Wasserlinse
<i>Spirodela polyrrhiza</i>	Teichlinse

Gräser, Simsen und Binsen

Phragmites australis

Schilf

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 47 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 10.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 20 m Breite: 10 m Tiefe: 80 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist lückig und der Gehölzgürtel ist dicht im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist eu- bis hypertroph und es befindet sich im Reifestadium. Es ist damit einzustufen als naturnah und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Westen Ackernutzung statt.

Bemerkungen

Laubwald

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Osten ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

+

Gräser, Simsen und Binsen

Phragmites australis Schilf

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 48 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 11.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 6 m Breite: m Tiefe: 80 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
 Der Röhrichtgürtel ist spärlich und der Gehölzgürtel ist dicht im Norden wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist eu- bis hypertroph und es befindet sich im Reifestadium.
 Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

ca. 1,50 m tiefe Senke mit 2 m² Modderloch

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Salix spec.

Weide

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Typha latifolia

Breitblättriger Rohrkolben

• *Lemna minor*

Kleine Wasserlinse

Equisetum fluviatile

Teich-Schachtelhalm

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 49 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 10.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 15 m Breite: 10 m Tiefe: 100 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist fehlend, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

gut ausgeprägter Ackertümpel mit halbklaarem Wasser, übliche Fauna

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Triturus

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

* <i>Potamogeton natans</i>	Schwimmendes Laichkraut
<i>Spirodela polyrrhiza</i>	Teichlinse
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Gewöhnlicher Froschlöffel
<i>Elodea canadensis</i>	Kanadische Wasserpest
<i>Lycopus europaeus</i>	Ufer-Wolfstrapp

Gräser, Simsen und Binsen

<i>Carex spec.</i>	Segge
<i>Schoenoplectus lacustris</i> a	Gewöhnliche Teichsimse
<i>Carex pseudocyperus</i>	Scheinzyper-Segge

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 50 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 22.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 20 m Breite: 15 m Tiefe: 70 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
 Der Röhrichtgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **dicht** im Westen, wobei die Beschattung zwischen **30 - 60%** liegt. Die Gewässertrophie ist **nicht einschätzbar** und es befindet sich im Reifestadium.
 Es ist damit einzustufen als **teilweise beeinträchtigt** und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Süden Ackernutzung statt.
 Die Gewässernachbarnutzung besteht im Süden aus Wiese oder Brache.

Bemerkungen

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Norden ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

mass. Anisoptera-Larven

Mollusken

Gehölze

Quercus robur

Stiel-Eiche

Carpinus betulus

Hainbuche

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Mentha aquatica

Wasser-Minze

Equisetum spec.

Schachtelhalm

Gräser, Simsen und Binsen

Juncus effusus

Flatter-Binse

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 51 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 22.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 15 m Breite: 10 m Tiefe: 60 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist lückig im Norden, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.
Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

verlandeter Tümpel mit Gehölzgruppe im Norden

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Alnus glutinosa

Schwarz-Erle

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Elodea canadensis

Kanadische Wasserpest

Gräser, Simsen und Binsen

Phalaris arundinacea

Rohrglanzgras

Eleocharis palustris agg

Gewöhnliche Sumpfbirse

Phragmites australis

Schilf

Carex spec.

Segge

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 52 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 17.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 50 m Breite: 30 m Tiefe: 50 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist lückig und der Gehölzgürtel ist lückig im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist eu- bis hypertroph und es befindet sich im Reifestadium.
Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer wurde als Teichbiotop angelegt.

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Die Gewässernachbarnutzung besteht im Umkreis aus Wiese oder Brache.

Bemerkungen

Wasserwanzen, Egel, insgesamt recht artenreiche Flora, anoxisch, flachgründig, Algen

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Rana spec.

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Lemna minor

Kleine Wasserlinse

• *Typha latifolia*

Breitblättriger Rohrkolben

Gräser, Simsen und Binsen

Phragmites australis

Schilf

Juncus effusus

Flatter-Binse

Carex spec.

Segge

Juncus spec.

Binse

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 53 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 18.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 50 m Breite: 15 m Tiefe: 160 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
 Der Röhrichtgürtel ist lückig und der Gehölzgürtel ist lückig im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.
 Es ist damit einzustufen als beeinträchtigt

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer wurde als Regenklär- oder Regenrückhaltebecken angelegt.

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft zum Stillgewässer findet im Südosten Weidenutzung statt.
 Im Nordwesten des Gewässers befindet sich eine Siedlung bzw. Gärten.

Bemerkungen

Karpfenbesatz, Wasserscorpion, viele Agyroneta, Algenwatten, Anlage an kleinem natürlichem Tümpel

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Notonecta, Wasserkäfer, Plattenwanzen, Aeshnidae im Flug

Mollusken

1 Molch

Gehölze

Alnus glutinosa

Schwarz-Erle

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Typha latifolia

Breitblättriger Rohrkolben

Iris pseudacorus

Sumpf-Schwertlilie

Alisma plantago-aquatica

Gewöhnlicher Froschlöffel

Lemna minor

Kleine Wasserlinse

Potamogeton natans

Schwimmendes Laichkraut

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 54 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 09.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 20 m Breite: 20 m Tiefe: 0 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **dicht** im **Umkreis**, wobei die Beschattung zwischen **60 - 100%** liegt. Die Gewässertrophie ist **nicht einschätzbar** und es befindet sich im Reifestadium.

Es ist damit einzustufen als **teilweise beeinträchtigt** und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

Temporärer Tümpel

In Nachbarschaft zum Stillgewässer findet im Umkreis Weidenutzung statt.
Im Westen des Gewässers befindet sich eine Siedlung bzw. Gärten.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Alnus glutinosa
Fraxinus excelsior

Schwarz-Erle
Gemeine Esche

+

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 55 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 09.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 25 m Breite: 20 m Tiefe: 70 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist spärlich und der Gehölzgürtel ist lückig im Norden, wobei die Beschattung zwischen 30 - 60% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer ist ein Fischteich.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Westen Ackernutzung statt.

Karpfenbesatz

In Nachbarschaft zum Stillgewässer findet im Osten Weidenutzung statt.

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Süden ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

wenige Käfer

Mollusken

Gehölze

Salix spec.

Weide

Picea spec.

Fichte

Sorbus aucuparia

Eberesche

Alnus glutinosa

Schwarz-Erle

Sambucus nigra

Schwarzer Holunder

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Ceratophyllum submersum Zartes Hornkraut

• *Nymphaea spec.* Seerose

Typha latifolia Breitblättriger Rohrkolben

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 56 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 18.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 20 m Breite: 15 m Tiefe: 80 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **dicht** im **Umkreis**, wobei die Beschattung zwischen **0 - 30%** liegt. Die Gewässertrophie ist **eu- bis hypertroph** und es befindet sich im **Reifestadium**.
Es ist damit einzustufen als **teilweise beeinträchtigt** und nach § 15 a **Landesnaturenschutzgesetz geschützt**.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

in 40 m Abstand Knick und Gehölz in N + O + W

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

viele Wasserscorpione, Kleinlibellen, 1 Sympetrum-Larve

Mollusken

Rana adult

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Potamogeton natans

Schwimmendes Laichkraut

Sparganium spec.

Igelkolben

Gräser, Simsen und Binsen

Juncus effusus

Flatter-Binse

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 57 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 09.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 35 m Breite: 20 m Tiefe: 120 cm Sichttiefe: cm Seifenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist fehlend, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

4 m tiefe steile Böschung

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Klein- + Großlibellenlarven

Mollusken

2 Schneckenarten

Molche

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

<i>Typha latifolia</i>	Breitblättriger Rohrkolben
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüßer Nachtschatten
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Gewöhnlicher Froschlöffel
<i>Potamogeton natans</i>	Schwimmendes Laichkraut
<i>Spirodela polyrrhiza</i>	Teichlinse

Gräser, Simsen und Binsen

Phalaris arundinacea Rohrglanzgras
Schoenoplectus lacustris a Gewöhnliche Teichsimse

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 58 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 06.10.95

Länge bzw. Durchmesser: 20 m Breite: 8 m Tiefe: 80 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist fehlend und der Gehölzgürtel ist lückig im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

Ruderalsaum im Süden, Drainageeinleitung, Pinonierstadium/-Gehölz

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Norden ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

<i>Prunus spinosa</i>	Schwarzdorn
<i>Salix spec.</i>	Weide
<i>Crataegus monogyna agg.</i>	Eingriffeliger Weißdorn
<i>Corylus avellana</i>	Haselnuß
<i>Viburnum spec.</i>	Schneeball

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

<i>Spirodela polymorpha</i>	Teichlinse
<i>Lycopus europaeus</i>	Ufer-Wolfstrapp
<i>Oenanthe aquatica</i>	Wasserfenchel

Gräser, Simsen und Binsen

<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Binse
<i>Carex paniculata</i>	Rispen-Segge

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 59 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 10.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 25 m Breite: 10 m Tiefe: 90 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
 Der Röhrichtgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **lückig** im **Umkreis**, wobei die Beschattung zwischen **0 - 30%** liegt. Die Gewässertrophie ist **nicht einschätzbar** und es befindet sich im **Reifestadium**.
 Es ist damit einzustufen als **naturnah** und nach § 15 a **Landesnaturenschutzgesetz geschützt**.

Entstehung und Nutzung

Beelträchtigungen

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Umkreis ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

2 Notonecta-Arten, Libellenlarven

Mollusken

Rana juv. + adult, Molche klein + groß (2 Arten)

Gehölze

<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle
<i>Salix spec.</i>	Weide
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder
<i>Corylus avellana</i>	Haselnuß
<i>Crataegus monogyna</i> agg.	Eingriffeliger Weißdorn

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

<i>Spirodela polyrrhiza</i>	Teichlinse
-----------------------------	------------

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 60 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 10.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 20 m Breite: m Tiefe: 50 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist dicht im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist eu- bis hypertroph und es befindet sich im Altersstadium mit Verlandungszonen. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Feldgehölz mit Verlandungszone

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Salix spec.

Weide

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Solanum dulcamara

Bittersüßer Nachtschatten

* *Lysimachia vulgaris*

Gemeiner Gilbweiderich

Gräser, Simsen und Binsen

Phragmites australis

Schilf

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 61 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 15.09.95

Länge bzw. Durchmesser: 15 m Breite: m Tiefe: 80 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
 Der Röhrichtgürtel ist lückig und der Gehölzgürtel ist lückig im Umkreis , wobei die Beschattung zwischen
 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.
 Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Salix spec.

Quercus robur

Weide

Stiel-Eiche

+

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Gräser, Simsen und Binsen

Phragmites australis

Schilf

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 62 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 09.10.95

Länge bzw. Durchmesser: 15 m Breite: m Tiefe: 0 cm Sichttiefe: cm Seltensstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist dicht im Osten, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Altersstadium mit Verlandungszonen. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

verlandeter Ackertümpel mit Bultensegge

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze
Salix spec.

Weide

+

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Gräser, Simsen und Binsen

Carex spec.

Segge

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 63 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 10.10.95

Länge bzw. Durchmesser: 25 m Breite: 15 m Tiefe: 150 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **dicht** im **Umkreis**, wobei die Beschattung zwischen **60 - 100%** liegt. Die Gewässertrophie ist **nicht einschätzbar** und es befindet sich im **Reifestadium**.
Es ist damit einzustufen als **teilweise beeinträchtigt** und nach § 15 a **Landesnaturenschutzgesetz geschützt**.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Das Stillgewässer wird durch Schnittgut- oder Buschablagerungen beeinträchtigt.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis **Ackernutzung** statt.

Bemerkungen

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Salix spec.

Weide

Viburnum spec.

Schneeball

Crataegus monogyna agg.

Eingriffeliger Weißdorn

Quercus robur

Stiel-Eiche

Alnus glutinosa

Schwarz-Erle

Rosa canina

Hunds-Rose

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 64 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 11.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 10 m Breite: m Tiefe: 50 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist fehlend, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist eu- bis hypertroph und es befindet sich im Altersstadium mit Verlandungszonen. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

Verlandungszone zu 95% aus Carex und zu 5% aus Landschilf

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

+

Gräser, Simsen und Binsen

Carex spec. Segge

Phragmites australis Schilf

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 65

Gemeinde: Rohlstorf

Kartierer:

Czech

Datum: 11.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 35 m Breite: m Tiefe: 80 cm Sichttiefe: cm Seltestreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist fehlend und der Gehölzgürtel ist dicht im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 30 - 60% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Altersstadium mit Verlandungszonen. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

Restwasserfläche völlig verweidet,
Gehölzstandene + -durchsetzte 3 m tiefe
Senke mit Mittelsteg, 95% von Ruderalflora
durchsetzt

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Crataegus monogyna agg. Eingriffeliger Weißdorn

Salix spec. Weide

Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

+

Gräser, Simsen und Binsen

Phragmites australis Schilf

Nachtschatten

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 66 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 17.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 30 m Breite: 20 m Tiefe: 80 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist lückig und der Gehölzgürtel ist dicht im Südwesten, wobei die Beschattung zwischen 30 - 60% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

3 m tiefes steiles Wasserprofil

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Norden ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Anisoptera-Larven, Zygoptera-Larven, Notonecta, div. Käfer

Mollusken

Palnorbarien

Triturus P

Gehölze

Salix spec.

Weide

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Spirodela polyrrhiza

Teichlinse

• *Potamogeton natans*

Schwimmendes Laichkraut

Iris pseudacorus

Sumpf-Schwertlilie

Eupatorium cannabinum

Wasserdost

Oenanthe aquatica

Wasserfenchel

Sparganium erectum

Aufrechter Igelkolben

Gräser, Simsen und Binsen

Phalaris arundinacea

Rohrglanzgras

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 67 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 17.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 40 m Breite: 25 m Tiefe: 80 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
 Der Röhrichtgürtel ist spärlich und der Gehölzgürtel ist lückig im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 30 - 60% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.
 Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

Agrostis-Verlandung

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Alnus glutinosa

Salix spec.

Schwarz-Erle

Weide

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Hottonia palustris

• *Solanum dulcamara*

Wasserfeder

Bittersüßer Nachtschatten

Gräser, Simsen und Binsen

Glyceria fluitans agg

Agrostis stolonifera

Flutender Schwaden

Weißes Straußgras

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 68 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 04.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 15 m Breite: 10 m Tiefe: 80 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist lückig und der Gehölzgürtel ist dicht im Norden, wobei die Beschattung zwischen 30 - 60% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.

Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer wurde als Teichbiotop angelegt.

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Südwesten Ackernutzung statt.

Bemerkungen

ca 20 Jahre alt, direkter Anschluß: vernähte Fichtenpflanzung mit Weidenbruchholz. Die Fichtenanpflanzung ist stärker verschattet, der Wasserstand fällt bis auf 10 cm und wenige m² Ausdehnung

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Nordosten ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Das Stillgewässer ist ein potentieller Laichplatz der Erdkröte (*Bufo bufo*).

Insekten

Anisoptera-Larven

Mollusken

Tritura-Larven, *Rana* juv.

Schlamm Schnecken

Gehölze

<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche
<i>Picea spec.</i>	Fichte
<i>Acer spec.</i>	Ahorn

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

<i>Lemna trisulca</i>	Dreifurchige Wasserlinse
<i>Spirodela polyrrhiza</i>	Teichlinse
<i>Potamogeton natans</i>	Schwimmendes Laichkraut
<i>Nymphaea alba</i>	Weißer Seerosen
<i>Hottonia palustris</i>	Wasserfeder
<i>Iris pseudacorus</i>	Sumpf-Schwertlilie
<i>Oenanthe aquatica</i>	Wasserfenchel
<i>Lycopus europaeus</i>	Ufer-Wolfstrapp
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüßer Nachtschatten

Gräser, Simsen und Binsen

<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohrglanzgras
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Binse
<i>Agrostis stolonifera</i>	Weißes Straußgras

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 69 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 17.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 15 m Breite: m Tiefe: 80 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist fehlend und der Gehölzgürtel ist dicht im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

Waldtümpel mit schmalen Laubgehölzstreifen im Lärchenforst

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Umkreis ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Anisoptera-Larven, Dytiscus

Mollusken

Rana juv.

Gehölze

Carpinus betulus

Corylus avellana

Sambucus nigra

Hainbuche

Haselnuß

Schwarzer Holunder

+

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Spirodela polyrrhiza

Teichlinse

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 70 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 17.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 15 m Breite: m Tiefe: 0 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **dicht** im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist **nicht einschätzbar** und es befindet sich im **Altersstadium mit Verlandungszonen**. Es ist damit einzustufen als **teilweise beeinträchtigt** und nach § 15 a **Landesnaturenschutzgesetz geschützt**.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft zum Stillgewässer findet im Umkreis Weidenutzung statt.

Bemerkungen

ehemaliger Weidetümpel zur Zeit trocken,
nicht kartiert

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

+

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 71 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 09.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 30 m Breite: 20 m Tiefe: 60 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **lückig** im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen **30 - 60%** liegt. Die Gewässertrophie ist **nicht einschätzbar** und es befindet sich im Reifestadium. Es ist damit einzustufen als **teilweise beeinträchtigt** und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Südosten Ackernutzung statt.

Bemerkungen

Waldrandsenke mit 5 - 10 m breitem Gehölzsaum

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Nordwesten ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Salix spec.

Quercus robur

Weide

Stiel-Eiche

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Urtica dioica

Große Brennnessel

+

Gräser, Simsen und Binsen

Juncus effusus

Flatter-Binse

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 72 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 09.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 5 m Breite: m Tiefe: 80 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist spärlich und der Gehölzgürtel ist fehlend, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.
Es ist damit einzustufen als beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Das Stillgewässer wird durch Schnittgut- oder Buschablagerungen beeinträchtigt.
Das Stillgewässer ist mit großflächigen Feldsteinablagerungen verfüllt.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

totes Loch

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

<i>Sparganium spec.</i>	Igelkolben
<i>Iris pseudacorus</i>	Sumpf-Schwertlilie
<i>Mentha arvensis</i>	Acker.Minze

Gräser, Simsen und Binsen

Phalaris arundinacea Rohrglanzgras

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 73 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 17.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 20 m Breite: m Tiefe: cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **fehlend**, wobei die Beschattung zwischen **0 - 30%** liegt. Die Gewässertrophie ist **nicht einschätzbar** und es befindet sich im **Reifestadium**.
Es ist damit einzustufen als **beeinträchtigt**

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer wurde als Teichbiotop angelegt.

Beeinträchtigungen

Das Gewässer ist ein Fischteich.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Im Umkreis des Gewässers befindet sich eine Siedlung bzw. Gärten.

Bemerkungen

nur Anfrage, Besichtigungsverbot, Möller-Höppner, nach Aussagen: massenhaft Frösche, Naturtümpel ausgebaggert, Kurbell als Vorfluter umgeleitet, lief früher hindurch, Karpfenbesatz

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 74 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 09.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 50 m Breite: 30 m Tiefe: 70 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist lückig im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

Fische natürlich, angelegte Insel

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Umkreis ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Nepidae, Notonecta, Wanzen, Zygoptera-Larven, Sympetrum, Lestes, Aeshna (2 Arten)

Mollusken

Gehölze

Salix spec.

Sorbus aucuparia

Populus spec.

Weide

Eberesche

Pappel

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Typha latifolia

• *Epilobium spec.*

Urtica dioica

Cirsium spec.

Lemna minor

Breitblättriger Rohrkolben

Weidenröschen

Große Brennnessel

Kratzdistel

Kleine Wasserlinse

Gräser, Simsen und Binsen

Carex spec.

Segge

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 75 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 09.10.95

Länge bzw. Durchmesser: 12 m Breite: m Tiefe: cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **dicht** im **Westen**, wobei die Beschattung zwischen **30 - 60%** liegt. Die Gewässertrophie ist **nicht einschätzbar** und es befindet sich im **Reifestadium**.
Es ist damit einzustufen als **teilweise beeinträchtigt**

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Stillgewässer ist durch Müllablagerungen belastet.

Das Kleingewässer ist ein Feuerlöschteich.

Das Gewässer ist ein Fischteich.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

halbsteile Ufer, Urtica-Gürtel, Sied, Wasser trübe, vermüllt, Karpfenbesatz

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Salix spec.

Fraxinus excelsior

Acer spec.

Weide

Gemeine Esche

Ahorn

Kräuter mit Röhrich- und Wasservegetation

Urtica dioica

Große Brennnessel

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 76 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 18.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 15 m Breite: 15 m Tiefe: 80 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **lückig** im **Südwesten**, wobei die Beschattung zwischen **0 - 30%** liegt. Die Gewässertrophie ist **nicht einschätzbar** und es befindet sich im **Reifestadium**.
Es ist damit einzustufen als **beeinträchtigt**

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Das Kleingewässer ist ein Feuerlöschteich.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

Feldsteine im Süden und Westen,
langweiliger Lösschteich mit Fischbesatz bis
zu 3 m Böschung, aber im Süden: 30 m
Verlandung

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Salix spec.

Quercus robur

Weide

Stiel-Eiche

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Iris pseudacorus

+ *Lysimachia vulgaris*

Oenanthe aquatica

Sumpf-Schwertlilie

Gemeiner Gilbweiderich

Wasserfenchel

Gräser, Simsen und Binsen

Carex spec.

Glyceria maxima

Segge

Wasser-Schwaden

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 77 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 21.08.95

Länge bzw. Durchmesser:	10	m	Breite:		m	Tiefe:	60	cm	Sichttiefe:		cm	Seltenstreifen:		m
Der Röhrichtgürtel ist fehlend und der Gehölzgürtel ist dicht im Osten , wobei die Beschattung zwischen 30 - 60% liegt. Die Gewässertrophie ist eu- bis hypertroph und es befindet sich im Reifestadium . Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt .														

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Kleingewässer ist ein Feuerlöschteich.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

Spinnen, Wasserscorpione, mind. 40 Jahre alter Löschteich auf einem Hof

Im Umkreis des Gewässers befindet sich eine Siedlung bzw. Gärten.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

viele Anisoptera-Larven

Mollusken

viele Jungfrösche

Gehölze

Sambucus nigra

Salix spec.

Schwarzer Holunder

Weide

+

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Lemna minor

Kleine Wasserlinse

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 78 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 21.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 20 m Breite: 10 m Tiefe: cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist lückig im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 30 - 60% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Südwesten Ackernutzung statt.

Bemerkungen

Waldtümpel, Randlage mit Entwässerungsgraben

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Nordosten ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Alnus glutinosa

Schwarz-Erle

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Sonchus spec.

Gänsedistel

• *Urtica dioica*

Große Brennnessel

Eupatorium cannabinum

Wasserdost

Gräser, Simsen und Binsen

Carex spec.

Segge

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 79 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 11.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 12 m Breite: m Tiefe: 120 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **lückig** im **Nordwesten**, wobei die Beschattung zwischen **0 - 30%** liegt. Die Gewässertrophie ist **eu- bis hypertroph** und es befindet sich im **Reifestadium**.
Es ist damit einzustufen als **teilweise beeinträchtigt** und nach § 15 a **Landesnaturschutzgesetz geschützt**.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

1 - 2 m hohe, steile Böschung

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Molche

Gehölze

Salix spec.

Weide

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

<i>Spirodela polyrrhiza</i>	Teichlinse
* <i>Iris pseudacorus</i>	Sumpf-Schwertlilie
<i>Oenanthe aquatica</i>	Wasserfenchel
<i>Berula erecta</i>	Aufrechter Merk
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Gewöhnlicher Froschlöffel

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 80 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 10.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 15 m Breite: 15 m Tiefe: 100 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
 Der Röhrichtgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **dicht** im **Umkreis**, wobei die Beschattung zwischen **60 - 100%** liegt. Die Gewässertrophie ist **nicht einschätzbar** und es befindet sich im **Reifestadium**.
 Es ist damit einzustufen als **teilweise beeinträchtigt** und nach § 15 a **Landesnaturenschutzgesetz geschützt**.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

starker Laubeinfall, Uferzone anoxisch

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Süden ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Quercus robur

Salix spec.

Crataegus monogyna agg.

Fraxinus excelsior

Stiel-Eiche

Weide

Eingriffeliger Weißdorn

Gemeine Esche

+

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Spirodela polyrrhiza

Teichlinse

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 81 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 16.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 15 m Breite: 6 m Tiefe: 50 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
 Der Röhrichtgürtel ist lückig und der Gehölzgürtel ist dicht im Westen, wobei die Beschattung zwischen 30 - 60% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.
 Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

temporär

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

junge Rana

Gehölze

Salix spec.

Weide

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Solanum dulcamara

Bittersüßer Nachtschatten

+

Spirodela polyrrhiza

Teichlinse

Gräser, Simsen und Binsen

Agrostis stolonifera

Weißes Straußgras

Carex pseudocyperus

Scheinzyper-Segge

Phalaris arundinacea

Rohrglanzgras

Schoenoplectus lacustris a Gewöhnliche Teichsimse

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 82 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 16.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 25 m Breite: 12 m Tiefe: 100 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist lückig und der Gehölzgürtel ist lückig im Norden, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist eu- bis hypertroph und es befindet sich im Reifestadium. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

sehr steiles 3 m hohes Uferprofil

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Das Stillgewässer ist ein potentieller Laichplatz der Erdkröte (*Bufo bufo*).

Insekten

Zygoptera-Larven, Anisoptera-Larven

Mollusken

Molche

Gehölze

<i>Salix spec.</i>	Weide
<i>Crataegus monogyna agg.</i>	Eingriffeliger Weißdorn
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche
<i>Prunus spinosa</i>	Schwarzdorn
<i>Rubus fruticosus</i>	Brombeere

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

<i>Spirodela polyrrhiza</i>	Teichlinse
<i>Lemna trisulca</i>	Dreifurchige Wasserlinse
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüßer Nachtschatten
<i>Sparganium spec.</i>	Igelkolben

Gräser, Simsen und Binsen

<i>Carex pseudocyperus</i>	Scheinzyper-Segge
----------------------------	-------------------

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 83 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 16.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 15 m Breite: 8 m Tiefe: 100 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist fehlend, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist eu- bis hypertroph und es befindet sich im Reifestadium.

Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

verlandeter Drainagetümpel

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

<i>Spirodela polyrrhiza</i>	Teichlinse
• <i>Galium palustre</i>	Sumpf-Labkraut
<i>Bidens spec.</i>	Zweizahn

Gräser, Simsen und Binsen

<i>Agrostis stolonifera</i>	Weißes Straußgras
<i>Eleocharis palustris agg</i>	Gewöhnliche Sumpfbinsse
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Binse
<i>Carex spec.</i>	Segge
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohrglanzgras

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 84 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 15.09.95

Länge bzw. Durchmesser: 200 m Breite: 40 m Tiefe: cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **fehlend**, wobei die Beschattung zwischen
0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist **nicht einschätzbar** und es befindet sich im **Reifestadium**.
Es ist damit einzustufen als **teilweise beeinträchtigt** und nach § 15 a **Landesnaturenschutzgesetz geschützt**.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer wurde als Teichbiotop angelegt.

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Die Gewässernachbarnutzung besteht im Umkreis aus Wiese oder Brache.

Bemerkungen

großangelegte Weiheranlage in
Extensivierungsfläche mit Gehölzanpflanzung
auf Abstand zum Ufer, im Westen
ausgedehntes Seggenried

Amphibien

Das Stillgewässer ist ein potentieller Laichplatz der
Erdkröte (Bufo bufo).

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Rana juv.

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

+

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 85 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 16.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 20 m Breite: 15 m Tiefe: 80 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist lückig und der Gehölzgürtel ist dicht im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Relfestadium.
Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten Notonecta

Mollusken

Gehölze

Salix spec.

Weide

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Spirodela polyrrhiza

Teichlinse

• *Typha latifolia*

Breitblättriger Rohrkolben

Iris pseudacorus

Sumpf-Schwertlilie

Gräser, Simsen und Binsen

Carex pseudocyperus

Scheinzyper-Segge

Glyceria maxima

Wasser-Schwaden

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 86 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 11.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 30 m Breite: 20 m Tiefe: 100 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **lückig** im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen **30 - 60%** liegt. Die Gewässertrophie ist **eu- bis hypertroph** und es befindet sich im Reifestadium.

Es ist damit einzustufen als **teilweise beeinträchtigt** und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

in 1,5 m tiefer Senke: länglicher Tümpel mit Ruderalflur an Böschung, Hochsitz

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Molchlarven

Gehölze

Quercus robur

Fagus sylvatica

Stiel-Eiche

Rotbuche

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Elodea canadensis

Lemna minor

Potamogeton natans

Kanadische Wasserpest

Kleine Wasserlinse

Schwimmendes Laichkraut

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 87 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 11.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 30 m Breite: 25 m Tiefe: 100 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
 Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist fehlend, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.
 Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

Wasserfläche zur Zeit 1/8

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Zygoptera-Larven, div. Wasserkäfer, Notonecta

Mollusken

viele Jungfrösche, Molche, Molchlarven

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Solanum dulcamara

Bittersüßer Nachtschatten

Typha latifolia

Breitblättriger Rohrkolben

Lemna minor

Kleine Wasserlinse

Equisetum palustre

Sumpf-Schachtelhalm

Gräser, Simsen und Binsen

Carex spec.

Segge

Schoenoplectus lacustris a Gewöhnliche Teichsimse

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 88 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 09.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 40 m Breite: m Tiefe: 150 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist fehlend, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist eu- bis hypertroph und es befindet sich im Reifestadium. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 16 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Notonecta

Mollusken

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

<i>Potamogeton natans</i>	Schwimmendes Laichkraut
<i>Oenanthe aquatica</i>	Wasserfenchel
<i>Typha latifolia</i>	Breitblättriger Rohrkolben

Gräser, Simsen und Binsen

Phragmites australis Schilf

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 89 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 09.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 50 m Breite: 25 m Tiefe: cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
 Der Röhrichtgürtel ist spärlich und der Gehölzgürtel ist dicht im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist eu- bis hypertroph und es befindet sich im Reifestadium.
 Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft zum Stillgewässer findet im Südwesten Weidenutzung statt.

Bemerkungen

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Umkreis ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

1 Frosch

Spitzschlamm Schnecken (viele tot), Posthornschnecken

Gehölze

Alnus glutinosa

Schwarz-Erle

Salix spec.

Weide

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Iris pseudacorus

Sumpf-Schwertlilie

* *Mentha aquatica*

Wasser-Minze

Solanum dulcamara

Bittersüßer Nachtschatten

Lysimachia vulgaris

Gemeiner Gilbweiderich

Ranunculus aquatilis agg.

Wasser-Hahnenfuß

Lythrum salicaria

Blut-Weiderich

Galium palustre

Sumpf-Labkraut

Scutellaria spec.

Helmkraut

Gräser, Simsen und Binsen

Scirpus sylvaticus

Wald-Simse

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 90 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 09.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 30 m Breite: 20 m Tiefe: 100 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
 Der Röhrichtgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **dicht** im Umkreis wobei die Beschattung zwischen **60 - 100%** liegt. Die Gewässertrophie ist **nicht einschätzbar** und es befindet sich im **Reifestadium**.
 Es ist damit einzustufen als **teilweise beeinträchtigt** und nach § 15 a **Landesnaturenschutzgesetz geschützt**.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Weidenbruch mit steiler (5 m) Böschung zur Straße

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Nordwesten ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

<i>Salix spec.</i>	Weide
<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche
<i>Populus spec.</i>	Pappel

*

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

<i>Iris pseudacorus</i>	Sumpf-Schwertlilie
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüßer Nachtschatten
<i>Lycopus europaeus</i>	Ufer-Wolfstrapp
<i>Petasites hybridus</i>	Rote Pestwurz
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gemeiner Gilbweiderich
<i>Galium palustre</i>	Sumpf-Labkraut
<i>Scutellaria spec.</i>	Helmkraut
<i>Oenanthe spec.</i>	Pferdesaat

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 91 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 28.09.95

Länge bzw. Durchmesser: 3 m Breite: m Tiefe: 80 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist lückig im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Altersstadium mit Verlandungszonen. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

schmaler Drainagetümpel, Asseln

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Daphnien, Anisoptera-Larven, Zygoptera-Larven, Nepidae

Mollusken

Schlammschnecken

Gehölze

Quercus robur

Stiel-Eiche

Alnus glutinosa

Schwarz-Erle

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Alisma plantago-aquatica

Gewöhnlicher Froschlöffel

*

Spirodela polyrrhiza

Teichlinse

Polygonum amphibium

Wasser-Knöterich

Sparganium erectum

Aufrechter Igelkolben

Lysimachia vulgaris

Gemeiner Gilbweiderich

Lycopus europaeus

Ufer-Wolfstrapp

Gräser, Simsen und Binsen

Glyceria fluitans agg

Flutender Schwaden

Juncus effusus

Flatter-Binse

Agrostis stolonifera

Weißes Straußgras

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 92 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 09.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 12 m Breite: 4 m Tiefe: 100 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist flüchtig und der Gehölzgürtel ist fehlend , wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer ist eine Viehtränke.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

sehr steile Uferböschung mit Wirtschaftsgräsern, Wasserscorpione, viele Egel

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Notonecta, Nepidae, 3 Käferarten, Sympetrum, Aeshna, Zygoptera-Paarung, Zygoptera-Larven

Mollusken

Molche

Spitzschlammschnecken

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Polygonum amphibium

Wasser-Knöterich

* *Spirodela polyrrhiza*

Teichlinse

Gräser, Simsen und Binsen

Phalaris arundinacea

Rohrglanzgras

Glyceria fluitans agg

Flutender Schwaden

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 93 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 08.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 25 m Breite: 12 m Tiefe: 100 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist fehlend und der Gehölzgürtel ist dicht im Osten, wobei die Beschattung zwischen 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.
Es ist damit einzustufen als beeinträchtigt

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Kleingewässer ist ein Feuerlöschteich.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

nat. Fische, nach dem Gehölzgürtel kahle, sehr steile Uferänder

In Nachbarschaft zum Stillgewässer findet im Nordwesten Weidenutzung statt.

Im Osten des Gewässers befindet sich eine Siedlung bzw. Gärten.

Im Süden des Gewässers verläuft eine Straße oder ein Weg.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten Notonecta

Mollusken

Gehölze

Quercus robur

Salix spec.

Prunus spinosa

Alnus glutinosa

Populus spec.

Corylus avellana

Stiel-Eiche

Weide

Schwarzdorn

Schwarz-Erle

Pappel

Haselnuß

+

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 94 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 08.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 10 m Breite: 4 m Tiefe: 100 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist spärlich und der Gehölzgürtel ist dicht im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Altersstadium mit Verlandungszonen. Es ist damit einzustufen als naturnah und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

2 Senken dicht nebeneinander

In Nachbarschaft zum Stillgewässer findet im Umkreis Weidenutzung statt.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Alnus glutinosa

Salix spec.

Schwarz-Erle

Weide

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Lysimachia vulgaris

+

Iris pseudacorus

Gemeiner Gilbweiderich

Sumpf-Schwertlilie

Gräser, Simsen und Binsen

Juncus effusus

Flatter-Binse

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 95 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 08.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 8 m Breite: m Tiefe: 100 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist fehlend und der Gehölzgürtel ist dicht im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.
Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

nitrophile Ruderalflur-Böschung

In Nachbarschaft zum Stillgewässer findet im Nordosten Weidenutzung statt.

Im Westen des Gewässers befindet sich eine Siedlung bzw. Gärten.

Im Süden des Gewässers verläuft eine Straße oder ein Weg.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Wasserkäfer, Notonecta, Zygoptera-Larven, Anisoptera-Larven

Mollusken

Molche, adulte Frösche

Gehölze

Acer spec.

Ahorn

Populus spec.

Pappel

Salix spec.

Weide

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Spirodela polyrrhiza

Teichlinse

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 96 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 08.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 10 m Breite: m Tiefe: 100 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist spärlich und der Gehölzgürtel ist lückig im Westen, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.
Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Die Gewässernachbarnutzung besteht im Umkreis aus Wiese oder Brache.

Bemerkungen

kreisrundes, langweiliges Loch im Wirtschaftsgrünland ohne Zaun, zur Zeit trocken

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Alnus glutinosa

Salix spec.

Schwarz-Erle

Weide

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Iris pseudacorus

Oenanthe spec.

* *Sparganium spec.*

Sumpf-Schwertlilie

Pferdesaat

Igelkolben

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 97 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 25.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 10 m Breite: m Tiefe: cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist fehlend und der Gehölzgürtel ist fehlend, wobei die Beschattung zwischen
0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.
Es ist damit einzustufen als beeinträchtigt

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer ist eine Viehtränke.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

pflanzenlose Viehtränke neu ausgebaggert,
Entenflott

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

+

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 98 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 25.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 15 m Breite: 10 m Tiefe: 140 cm Sichttiefe: cm Seifenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist fehlend, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Osten Ackernutzung statt. Die Gewässernachbarnutzung besteht im Umkreis aus Wiese oder Brache.

Bemerkungen

Wasserscorpion, Wasserwanzen

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Notonecta, 3 Arten Wasserkäfer,

Mollusken

2 Molcharten

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

<i>Sparganium spec.</i>	Igelkolben
<i>Bidens spec.</i>	Zweizahn
* <i>Lycopus europaeus</i>	Ufer-Wolfstrapp
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Gewöhnlicher Froschlöffel
<i>Spirodela polyrrhiza</i>	Teichlinse
<i>Potamogeton natans</i>	Schwimmendes Laichkraut
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennnessel
<i>Cirsium spec.</i>	Kratzdistel

Gräser, Simsen und Binsen

<i>Agrostis stolonifera</i>	Weißes Straußgras
<i>Glyceria fluitans agg</i>	Flutender Schwaden

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 99 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 26.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 25 m Breite: 15 m Tiefe: 100 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist dicht im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Altersstadium mit Verlandungszonen. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

Drainage

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Wasserkäfer

Mollusken

Schlamm Schnecken, Posthornschnecken

Gehölze

Salix spec.

Weide

Corylus avellana

Haselnuß

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Spirodela polyrrhiza

Teichlinse

Iris pseudacorus

Sumpf-Schwertlilie

Solanum dulcamara

Bittersüßer Nachtschatten

Mentha aquatica

Wasser-Minze

Equisetum spec.

Schachtelhalm

Eupatorium cannabinum

Wasserdost

Lemna gibba

Buckelige Wasserlinse

Gräser, Simsen und Binsen

Carex spec.

Segge

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 100 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 26.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 30 m Breite: 30 m Tiefe: 100 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist fehlend und der Gehölzgürtel ist dicht Im Süden, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.
Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturenschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer ist ein Fischteich.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Osten Ackernutzung statt.

In Nachbarschaft zum Stillgewässer findet im Nordwesten Weidenutzung statt.

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Süden ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten Notonecta

Mollusken

Bemerkungen

Enten- und Fischteich, Wildfische, Insel, im Süden Forstmonokultur, viele Jungfische, kantiges Uferprofil, nitrophiler Ruderalrasen, massenhaft Kleiner Fuchs

Gehölze

<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle
<i>Salix spec.</i>	Weide
<i>Picea spec.</i>	Fichte

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost
------------------------------	------------

Gräser, Simsen und Binsen

<i>Juncus spec.</i>	Binse
<i>Carex pseudocyperus</i>	Scheinzyper-Segge
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Wald-Simse

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 101 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 26.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 100 m Breite: 500 m Tiefe: cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **dicht** im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen **60 - 100%** liegt. Die Gewässertrophie ist **nicht einschätzbar** und es befindet sich im Altersstadium mit **Verlandungszonen**. Es ist damit einzustufen als **naturnah** und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

Bruchwald an Nadelforst

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Umkreis ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Alnus glutinosa

Schwarz-Erle

Salix spec.

Weide

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Hottonia palustris

Wasserfeder

Iris pseudacorus

Sumpf-Schwertlilie

Solanum dulcamara

Bittersüßer Nachtschatten

Mentha spec.

Minze

Gräser, Simsen und Binsen

Carex spec.

Segge

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 102 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 09.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 20 m Breite: 10 m Tiefe: 150 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist fehlend und der Gehölzgürtel ist lückig im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.

Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Das Stillgewässer ist mit großflächigen Feldsteinablagerungen verfüllt.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

anoxisch, kraterartiger, länglicher Drainagetümpel Weidengebüsch am Westhang ins Wasser ragend, Krebse

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

einige Käfer, Notonecta

Mollusken

Gehölze

Salix spec.

Weide

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Spirodela polyrrhiza

Teichlinse

Alisma plantago-aquatica

Gewöhnlicher Froschlöffel

* *Equisetum spec.*

Schachtelhalm

Gräser, Simsen und Binsen

Agrostis stolonifera

Weißes Straußgras

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 103 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 09.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 8 m Breite: m Tiefe: 100 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist lückig und der Gehölzgürtel ist lückig im Nordwesten, wobei die Beschattung zwischen 0-30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.
Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

Egelpest, kreisrunder Drainagetümpel mit steilem Uferprofil, keine Pufferzone, Besitzerin: Frau Lundgren (Segeberg)

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Furchenschwimmer, Käfer mit Stachelschwanz ohne Fühler, 1 Großlibelle

Mollusken

seit 2 Jahren Amphibienmeldung des Pächters

Gehölze

Salix spec.

Weide

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Spirodela polyrrhiza

Teichlinse

Mentha arvensis

Acker.Minze

Iris pseudacorus

Sumpf-Schwertlilie

Oenanthe aquatica

Wasserfenchel

Bidens spec.

Zweizahn

Lemna gibba

Buckelige Wasserlinse

Gräser, Simsen und Binsen

Agrostis stolonifera

Weißes Straußgras

Carex spec.

Segge

Juncus spec.

Binse

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 104 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 16.10.95

Länge bzw. Durchmesser: 13 m Breite: 6 m Tiefe: cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist spärlich und der Gehölzgürtel ist lückig im Nordwesten, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.

Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Das Stillgewässer ist durch Müllablagerungen belastet.

Das Stillgewässer ist mit großflächigen Feldsteinablagerungen verfüllt.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

Ruderalböschung

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Salix spec.

Weide

Corylus avellana

Haselnuß

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Sparganium erectum

Aufrechter Igelkolben

Solanum dulcamara

Bittersüßer Nachtschatten

Urtica dioica

Große Brennnessel

Gräser, Simsen und Binsen

Carex spec.

Segge

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 105 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 21.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 5 m Breite: m Tiefe: 30 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **fehlend**, wobei die Beschattung zwischen **0 - 30%** liegt. Die Gewässertrophie ist **eu- bis hypertroph** und es befindet sich im **Reifestadium**.
Es ist damit einzustufen als **teilweise beeinträchtigt** und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Das Stillgewässer ist mit großflächigen Feldsteinablagerungen verfüllt.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

Wasserscorpione

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Notonecta, Zygoptera, Anisoptera

Mollusken

Rana adult

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüßer Nachtschatten
<i>Bidens spec.</i>	Zweizahn
* <i>Urtica dioica</i>	Große Brennnessel
<i>Lemna minor</i>	Kleine Wasserlinse
<i>Spirodela polyrrhiza</i>	Teichlinse

Gräser, Simsen und Binsen

Agrostis stolonifera Weißes Straußgras

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 106 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 17.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 15 m Breite: 8 m Tiefe: 0 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **dicht** im **Umkreis**, wobei die Beschattung zwischen **60 - 100%** liegt. Die Gewässertrophie ist **nicht einschätzbar** und es befindet sich im **Altersstadium mit Verlandungszonen**. Es ist damit einzustufen als **naturnah** und nach § 15 a **Landesnaturenschutzgesetz geschützt**.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis **Ackernutzung** statt.

Bemerkungen

temporärer Ackertümpel/Feldgehölzstadium, nicht weiter kartiert

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Salix spec.

Weide

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 107 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 17.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 25 m Breite: 15 m Tiefe: 120 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist fehlend, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.
Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Das Gewässer ist ein Fischteich.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

1 m tiefe, steile Böschung; sieht wie gemäht aus (im Wasser am Rand), durch Wassertiefe relativ großer Wasserkörper

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Anisoptera, Zygoptera, viele fliegende + paarende Aeshna versuchte Eiablage, viele Notonecta (2 gr. Arten), Wasserkäfer

Mollusken

Frösche

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

<i>Spirodela polymorpha</i>	Teichlinse
<i>Potamogeton natans</i>	Schwimmendes Laichkraut
<i>Iris pseudacorus</i>	Sumpf-Schwertlilie
<i>Sparganium spec.</i>	Igelkolben
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Gewöhnlicher Froschlöffel

Gräser, Simsen und Binsen

Schoenoplectus lacustris a Gewöhnliche Teichsimse
Carex pseudocyperus Scheinzyper-Segge

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 108 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 17.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 25 m Breite: 10 m Tiefe: 100 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
 Der Röhrichtgürtel ist spärlich und der Gehölzgürtel ist lückig im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.
 Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Alnus glutinosa

Schwarz-Erle

Salix spec.

Weide

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Typha latifolia

Breitblättriger Rohrkolben

Typha angustifolia

Schmalblättriger Rohrkolbe

* *Epilobium spec.*

Weidenröschen

Alisma plantago-aquatica

Gewöhnlicher Froschlöffel

Solanum dulcamara

Bittersüßer Nachtschatten

Bidens spec.

Zweizahn

Gräser, Simsen und Binsen

Juncus effusus

Flatter-Binse

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 109 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 22.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 15 m Breite: 8 m Tiefe: 80 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist fehlend, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist eu- bis hypertroph und es befindet sich im Altersstadium mit Verlandungszonen. Es ist damit einzustufen als beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

Verlandungsstadium mit Typha, typischer Urtica-Gürtel

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Urtica dioica

Große Brennnessel

Typha latifolia

Breitblättriger Rohrkolben

* *Sparganium erectum*

Aufrechter Igelkolben

Gräser, Simsen und Binsen

Carex pseudocyperus

Scheinzyper-Segge

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 110 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 22.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 30 m Breite: 30 m Tiefe: 80 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
 Der Röhrichtgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **lückig** im Norden, wobei die Beschattung zwischen **0 - 30%** liegt. Die Gewässertrophie ist **nicht einschätzbar** und es befindet sich im **Reifestadium**.
 Es ist damit einzustufen als **teilweise beeinträchtigt** und nach § 15 a **Landesnaturenschutzgesetz geschützt**.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer ist ein Fischteich.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

2 m steile Böschung, Wasserwanzen

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Notonecta

Mollusken

Schnecken, Muscheln

Gehölze

Salix spec.

Weide

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Potamogeton natans

Schwimmendes Laichkraut

Spirodela polyrrhiza

Teichlinse

*

Sparganium spec.

Igelkolben

Gräser, Simsen und Binsen

Juncus spec.

Binse

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 111 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 24.10.95

Länge bzw. Durchmesser: 25 m Breite: 20 m Tiefe: 0 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist lückig und der Gehölzgürtel ist dicht im Umkreis , wobei die Beschattung zwischen
60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Altersstadium mit Verlandungszonen.
Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.
Die Gewässernachbarnutzung besteht im Umkreis aus Wiese oder Brache.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

+

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 112 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 22.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 30 m Breite: 20 m Tiefe: 80 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **fehlend**, wobei die Beschattung zwischen **60 - 100%** liegt. Die Gewässertrophie ist **nicht einschätzbar** und es befindet sich im **Reifestadium**.
Es ist damit einzustufen als **teilweise beeinträchtigt** und nach § 15 a **Landesnaturenschutzgesetz geschützt**.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

amoxischer Bodengrund, massenhaft
Stichlinge, dünn und japsend, Bruchholz

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Umkreis ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Acer spec.

Fagus sylvatica

Fraxinus excelsior

Ahorn

Rotbuche

Gemeine Esche

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Lemna minor

Kleine Wasserlinse

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 113 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 04.08.95

Länge bzw. Durchmesser: m Breite: m Tiefe: cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist fehlend und der Gehölzgürtel ist fehlend, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Altersstadium mit Verlandungszonen. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

3 Tümpel, nicht weiter kartiert da keine typische Wasserpflanzen-Flora

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Osten ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

*

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 114 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 04.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 30 m Breite: 20 m Tiefe: 150 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
 Der Röhrichtgürtel ist lückig und der Gehölzgürtel ist lückig im Nordosten, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist eu- bis hypertroph und es befindet sich im Reifestadium.
 Es ist damit einzustufen als beeinträchtigt

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Kleingewässer ist ein Feuerlöschteich.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Die Gewässernachbarnutzung besteht im Umkreis aus Wiese oder Brache.

Bemerkungen

Mahd bis an die Böschungskante, keine Verlandungszone möglich, wird an Rohlstorf verpachtet

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Blaupfeil, Plattbauch, Sympetrum, Jungfer

Mollusken

Gehölze

Salix spec.

Sambucus nigra

Fraxinus excelsior

Weide

Schwarzer Holunder

Gemeine Esche

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Iris pseudacorus

Cirsium palustre

Cirsium arvense

Alisma plantago-aquatica

Typha latifolia

Sumpf-Schwertlilie

Sumpf-Kratzdistel

Acker-Kratzdistel

Gewöhnlicher Froschlöffel

Breitblättriger Rohrkolben

Gräser, Simsen und Binsen

Phragmites australis

Schilf

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 115 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 04.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 30 m Breite: 5 m Tiefe: 80 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
 Der Röhrichtgürtel ist lückig und der Gehölzgürtel ist lückig im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 0 - 30% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium.
 Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Das Kleingewässer ist ein Feuerlöschteich.

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

Stichlinge, grabenartiger Löschteich zwischen Straße + Feld, steile Böschung

In Nachbarschaft zum Stillgewässer findet im Umkreis Weidenutzung statt.

Im Süden des Gewässers verläuft eine Straße oder ein Weg.

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Westen ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Aeshna cyanea, div. Wasserkäfer, Libellen-Larven

Mollusken

Gehölze

Quercus robur Stiel-Eiche
Corylus avellana Haselnuß
Alnus glutinosa Schwarz-Erle
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Crataegus monogyna agg. Eingriffeliger Weißdorn
Salix spec. Weide
Fraxinus excelsior - Gemeine Esche, *Viburnum spec.* - Schneeb

Gräser, Simsen und Binsen

Juncus effusus Flatter-Binse

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Iris pseudacorus Sumpf-Schwertlilie
Solanum dulcamara Bittersüßer Nachtschatten
Lycopus europaeus Ufer-Wolfstrapp
Mentha aquatica Wasser-Minze
Lythrum salicaria Blut-Weiderich
Lemna minor Kleine Wasserlinse

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 116 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 22.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 35 m Breite: 25 m Tiefe: 150 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist spärlich und der Gehölzgürtel ist lückig im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist eu- bis hypertroph und es befindet sich im Reifestadium. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

starker Laubeinfall, steile 3 - 4 m tiefe Senke mit alten Weiden, viel Bruchholz in SO-Ecke, Wasserscorpione

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Notonecta, einige Käfer

Mollusken

Gehölze

Salix spec.

Weide

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Typha latifolia

Breitblättriger Rohrkolben

Spirodela polyrrhiza

Teichlinse

Lemna minor

Kleine Wasserlinse

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 117 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 21.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 40 m Breite: 20 m Tiefe: 150 cm Sichttiefe: cm Seifenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist geschlossen und der Gehölzgürtel ist dicht im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Altersstadium mit Verlandungszonen. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Crataegus monogyna agg. Eingriffeliger Weißdorn

Salix spec. Weide

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Gräser, Simsen und Binsen

Phragmites australis Schilf

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 118 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 21.08.95

Länge bzw. Durchmesser: 25 m Breite: 15 m Tiefe: 80 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist **fehlend** und der Gehölzgürtel ist **dicht** im **Osten**, wobei die Beschattung zwischen **0 - 30%** liegt. Die Gewässertrophie ist **eu- bis hypertroph** und es befindet sich im **Reifestadium**.
Es ist damit einzustufen als **teilweise beeinträchtigt** und nach § 15 a **Landesnaturenschutzgesetz geschützt**.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer wurde als Ton/Kiesgrube angelegt.

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

Bemerkungen

Wasserkörper wirkt ziemlich tot

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Das Stillgewässer ist ein potentieller Laichplatz der Erdkröte (*Bufo bufo*).

Insekten

Mollusken

junge Rana

Gehölze

Alnus glutinosa

Acer spec.

Schwarz-Erle

Ahorn

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Nadelgehölz

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 119 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 22.08.95

Länge bzw. Durchmesser: m Breite: m Tiefe: cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m
Der Röhrichtgürtel ist fehlend und der Gehölzgürtel ist dicht im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Altersstadium mit Verlandungszonen. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Das Gewässer ist als Tümpel entstanden

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

Feldgehölzsenke am Knick, nicht weiter kartiert

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Süden ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Alnus glutinosa

Salix spec.

Schwarz-Erle

Weide

+

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Gräser, Simsen und Binsen

Kartierungsbericht Stillgewässer

Nummer: 120 Gemeinde: Rohlstorf Kartierer: Czech Datum: 23.10.95

Länge bzw. Durchmesser: 20 m Breite: 15 m Tiefe: 5 cm Sichttiefe: cm Seitenstreifen: m

Der Röhrichtgürtel ist fehlend und der Gehölzgürtel ist dicht im Umkreis, wobei die Beschattung zwischen 60 - 100% liegt. Die Gewässertrophie ist nicht einschätzbar und es befindet sich im Reifestadium. Es ist damit einzustufen als teilweise beeinträchtigt und nach § 15 a Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Entstehung und Nutzung

Beeinträchtigungen

Nachbarnutzung / Biotopverbund

In Nachbarschaft des Kleingewässers findet im Umkreis Ackernutzung statt.

Bemerkungen

Laubwald im Süden, Waldrandtümpel, Westhälfte noch etwas tiefer

In Nachbarschaft des Kleingewässers steht im Süden ein Knick oder Gehölz.

Amphibien

Säugetiere

Vögel

Reptilien

Insekten

Mollusken

Gehölze

Alnus glutinosa

Schwarz-Erle

Salix spec.

Weide

Kräuter mit Röhricht- und Wasservegetation

Urtica dioica

Große Brennnessel

* *Solanum dulcamara*

Bittersüßer Nachtschatten

Equisetum spec.

Schachtelhalm

Gräser, Simsen und Binsen

Carex spec.

Segge